

## Avaruusgeometrian kysymyksiä

Tässä esitettävät tehtävät ja lauseet kattavat asioita, jotka saattavat tulla vastaan mahdollisissa kolmiulotteisen geometrian kilpailukysymyksissä. Lukemista helpottaa, jos selvittää itselleen peruskäsitteet: tason, monitahokkaan, monitahokkaan kärjet, särmit ja sivut eli sivutahkot, diedrin, triedrin (kolmitahkoinen soppi), sopen, avaruuskulman, prisman ja pallon.

**1.** Suorat  $\ell_1$ ,  $\ell_2$  ja  $\ell_3$  ovat samassa tasossa ja leikkaavat toisensa pisteessä  $P$ . Lisäksi  $\ell_1 \perp \ell$  ja  $\ell_2 \perp \ell$ . Silloin myös  $\ell_3 \perp \ell$ .

Valitaan  $\ell$ :n piste  $Q \neq P$ . Valitaan  $\ell_1$ :n pisteet  $A_1$  ja  $A'_1$  niin, että  $P$  on  $A_1A'_1$ :n keskipiste,  $A_2$  ja  $A'_2$  samoin  $\ell_2$ :lta.  $A_1A_2$  leikkaa  $\ell_3$ :n pisteessä  $A_3$  ja  $A'_1A'_2$  pisteessä  $A'_3$ . Kolmiot  $A_1A_2P$  ja  $A'_1A'_2P$  ovat yhteneviä (sks), joten  $A_1A_2 = A'_1A'_2$ . Koska  $\ell$  on  $A_1A'_1$ :n ja  $A_2A'_2$ :n keskinormaali,  $A_1Q = A'_1Q$  ja  $A_2Q = A'_2Q$ . Kolmiot  $A_1A_2Q$  ja  $A'_1A'_2Q$  ovat yhteneviä (sss). Kolmiot  $A_1A_3P$  ja  $A'_1A'_3P$  ovat yhteneviä (ksk). Kolmiot  $A_1A_3Q$  ja  $A'_1A'_3Q$  ovat yhteneviä (sks). Siis  $A_3Q = A'_3Q$ . Mutta tämä merkitsee, että  $\ell$  on myös  $A_3A'_3$ :n keskinormaali, eli  $\ell \perp \ell_3$ .

**2.** Piste  $P$  on säännöllisen tetraedrin sisällä etäisyyksillä  $a$ ,  $b$ ,  $c$  ja  $d$  tetraedrin sivutahkoista. Silloin  $a + b + c + d = h$ , missä  $h$  on tetraedrin korkeus.

Tetraedri jakautuu neljäksi samapohjaiseksi tetraedriksi, joilla on yhteinen kärki  $P$ . Tetraedrin tilavuus on  $V = \frac{1}{3}(a + b + c + d)A$ , missä  $A$  on sivutahkon ala. Mutta myös  $V = \frac{1}{3}hA$ .

**3.** Tetraedrin kärjistä vastakkaisten sivutahkojen painopisteisiin piirretyt janat (tetraedrin mediaanit) leikkaavat toisensa samassa pisteessä; tämä jakaa mediaanit suhteessa 3 : 1.

Olkoot  $M_D$  ja  $M_C$  tetraedrin  $ABCD$  sivutahkojen  $ABC$  ja  $ABD$  painopisteet. Jos  $E$  on  $AB$ :n keskipiste, niin  $M_C$  on janalla  $DE$  ja  $M_D$  janalla  $CE$ . Janat  $DM_D$  ja  $CM_C$  ovat siis tasossa  $DCE$ , samoin tietysti niiden leikkauspiste  $G$ . Olkoot kolmioiden  $M_DCG$ ,  $M_CDG$  ja  $CDG$  alat  $x$ ,  $y$  ja  $z$ . Koska  $M_DC = 2 \cdot M_DE$  ja  $M_CD = 2 \cdot M_CE$ , on kolmion  $EM_DG$  ala  $\frac{1}{2}x$  ja kolmion  $EM_CG$  ala  $\frac{1}{2}y$ . Kolmioiden  $EM_DD$  ja  $M_DCD$  aloista saadaan

$z + x = 2 \left( \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y \right) = x + 3y$ . Siis  $z = 3y$ . Mutta tämä merkitsee, että  $DG = 3 \cdot GM_D$ .

Mutta aivan samoin nähdään, että muut mediaanit leikkaavat  $DM_D$ :n pisteessä, joka jakaa  $DM_D$ :n suhteessa 3 : 1, eli pisteessä  $G$ .

**4.** Tetraedrin mediaanien kantapisteet kärkinä piirretty tetraedri on yhdenmuotoinen alkuperäisen tetraedrin kanssa; yhdenmuotoisuussuhde on 1 : 3.

Edellisen tehtävän yhteydessä nähtiin, että kolmiot  $EM_DM_C$  ja  $ECD$  ovat yhdenmuotoiset suhteessa 1 : 3. Sama pätee kaikkiin sivutahkojen painopisteiden yhdistysjanoihin: ne ovat kukin  $\frac{1}{3}$  vastaavasta tetraedrin särämästä. Kaikki tetraedrin  $M_AM_BM_CM_D$  sivutahkot ovat siis yhdenmuotoisia  $ABCD$ :n vastaavien sivutahkojen kanssa.

5. Jos tetraedrin kaikkien sivutahkojen piirit ovat yhtä pitkät, tetraedrin kaikki sivutahkot ovat keskenään yhteneviä.

Olkoon  $AB = a$ ,  $BC = b$ ,  $CA = c$ ,  $AD = d$ ,  $BD = e$ ,  $CD = f$ . Jos  $a + b + c = a + d + e$ , niin  $b + c = d + e$ , ja jos  $b + f + e = c + f + d$ , niin  $b + e = c + d$ . Saadaan  $c - e = e - c$ , eli  $c = e$ . Vastaavasti muut tetraedrin vastakkaiset särmit ovat yhtä pitkät:  $a = f$  ja  $b = d$ . Mutta tästä seuraa, että jokaiset kaksi sivutahkoa, joilla on yhteinen särmä, ovat yhtenevät (sss). Siis kaikki sivutahkot ovat yhtenevät.

6. Leikkaavatko tetraedrin korkeusjanat toisensa samassa pisteessä?

On mahdollista konstruoida esim. tetraedri  $ABCD$  niin, että  $CD \perp ABC$  ja  $BA \perp ADC$ . Tällöin  $DC$  ja  $BA$  ovat korkeusjanoja, jotka eivät leikkaa toisiaan.

7. Tiedrin tasokulmien summa on  $< 360^\circ$  ja sen diedrikulmien summa  $> 180^\circ$ .

Olkoon  $P$  tiedrin kärki. Erotetaan tiedrin särmiltä pisteet  $A$ ,  $B$  ja  $C$  niin, että  $AP = BP = CP$ . Olkoon  $Q$   $P$ :n kohtisuora projektio tasolla  $ABC$ . Silloin  $AQ = BQ = CQ$  (Pythagoras!) ja  $AQ < AP$  jne.  $ABQ$  ja  $ABP$  ovat tasakylkisiä kolmioita, joissa on sama kanta  $AB$ , mutta  $ABP$ :n yhtä pitkät sivut ovat pitemmät kuin  $ABQ$ :n yhtä pitkät sivut. Siis  $\angle APB < \angle AQB$ . Samoin  $\angle BPC < \angle BQC$  ja  $\angle CPA < \angle CQA$ . Mutta  $\angle AQB + \angle BQC + \angle CQA = 360^\circ$ .

Valitaan tiedrin  $PABC$  sisältä piste  $Q$ . Olkoot  $A'$  ja  $B'$   $Q$ :n projektiot tasoilla  $PBC$  ja  $PAC$ . Koska  $QA' \perp PC$  ja  $QB' \perp PC$ ,  $PC$  on kohtisuorassa tasoa  $QA'B'$  vastaan. Jos  $PC$  leikkaa  $QB'A'$ :n pisteessä  $C_1$ , niin  $B'C_1 \perp PC$  ja  $A'C_1 \perp PC$ . Nelikulmio  $QB'C_1A'$  on siis jännelikukulmio, ja  $\angle B'C_1A' = 180^\circ - \angle B'QA'$ . Mutta  $\angle B'C_1A'$  on tasojen  $APC$  ja  $BPC$  välinen diedrikulma. Jos  $C'$  sekä  $A_1$  ja  $B_1$  määritellään analogisesti, niin lauseen alkuosan perusteella (tiedri  $QA'B'C'$ !) on  $\angle A'C_1B' + \angle C'B_1A' + \angle B'A_1C' = 540^\circ - (\angle A'QB' + \angle B'QC' + \angle C'QA') > 540^\circ - 360^\circ = 180^\circ$ . (Näin syntynyt tiedri  $QA'B'C'$ , jonka tasokulmat ovat  $PABC$ :n diedrikulmien supplementtikulmia ( $\alpha$  ja  $180^\circ - \alpha$  ovat supplementtikulmia) ja diedrikulmat  $PABC$ :n tasokulmien supplementtikulmia, on  $PABC$ :n komplementtitiedri).

8. Jos tiedrin tasokulmat ovat  $\alpha$ ,  $\beta$  ja  $\gamma$  ja vastaavat diedrikulmat  $A$ ,  $B$  ja  $C$ , niin

$$\frac{\sin \alpha}{\sin A} = \frac{\sin \beta}{\sin B} = \frac{\sin \gamma}{\sin C}$$

(pallotrigonometrian sinilause).

Olkoon  $P$  tiedrin kärki. Valitaan tiedrin särmältä piste  $Q$ ; olkoon  $PQ = a$ . Olkoot  $Q_1$  ja  $Q_2$   $Q$ :n projektiot tiedrin muilla särmillä ja  $Q'$   $Q$ :n projektio tasolla  $PQ_1Q_2$ . Olkoon  $\angle QPQ_1 = \alpha$  ja  $\angle QPQ_2 = \beta$ . Samoin kuin edellisessä numerossa päätellään, että  $PQ_1$  on kohtisuorassa tasoa  $QQ_1Q'$  vastaan ja  $PQ_2$  on kohtisuorassa tasoa  $QQ_2Q'$  vastaan. Tästä seuraa, että  $\angle QQ_1Q' = B$  ja  $\angle QQ_2Q' = A$ . Suorakulmaisista kolmioista  $QPQ_2$  ja  $QQ_2Q'$  saadaan janan  $QQ'$  pituudeksi  $a \sin \beta \sin A$  ja kolmioista  $PQQ_1$  sekä  $QQ_1Q'$   $a \sin \alpha \sin B$ ; väite seuraa.

**9. Edellisen numeron merkinnöin**

$$\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos A$$

(pallotrigonometrian ensimmäinen kosinilause) ja

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos \alpha$$

(pallotrigonometrian toinen kosinilause).

Olkoon  $Q$  piste triedrin särmällä;  $PQ = 1$ ,  $Q_1$   $Q$ :n projektio toisella triedrin särmällä ja  $Q_2$  piste kolmannella särmällä niin, että  $PQ_1 \perp Q_1Q_2$ . Olkoon  $\angle QQ_1Q_2 = A$ ,  $\angle QPQ_2 = \alpha$ ,  $\angle QPQ_1 = \beta$  ja  $\angle Q_2Q_1 = \gamma$ . Suorakulmaisista kolmioista  $PQQ_1$  ja  $PQ_2Q_1$  saadaan  $PQ_1 = \cos \beta$ ,  $QQ_1 = \sin \beta$ ,  $PQ_2 = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}$  ja  $Q_1Q_2 = \cos \beta \tan \gamma = \frac{\cos \beta \sin \gamma}{\cos \gamma}$ . Lasketaan  $QQ_2$  kosinilauseen avulla kolmioista  $QPQ_2$  ja  $QQ_1Q_2$ . Saadaan  $1 + \frac{\cos^2 \beta}{\cos^2 \gamma} - 2 \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cos \alpha = \sin^2 \beta + \cos^2 \beta \frac{\sin^2 \gamma}{\cos^2 \gamma} - 2 \sin \beta \cos \beta \frac{\sin \gamma}{\cos \gamma} \cos A$ . Kun yhtälö lavennetaan  $\cos^2 \gamma$ :lla, saadaan  $\cos^2 \gamma + \cos^2 \beta - 2 \cos \beta \cos \gamma \cos \alpha = \sin^2 \beta \cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma \cos^2 \beta - 2 \sin \gamma \cos \gamma \cos \beta \sin \beta \cos A$ . Mutta  $\cos^2 \gamma (1 - \sin^2 \beta) + \cos^2 \beta (1 - \sin^2 \gamma) = 2 \cos^2 \beta \cos^2 \gamma$ . Kun supistetaan  $\cos \beta \cos \gamma$ :lla, jää pallotrigonometrian 1. kosinilauseen kaava. Toinen kosinilause seuraa ensimmäisestä, kun sitä sovelletaan komplemettitriedriin.

**10. Jos triedrin kaikki tasokulmat ovat tylppiä, niin kaikki diedrikulmat ovat tylppiä.**

Seuraa ensimmäisestä kosinilauseesta.

**11. Jos triedrin kaikki diedrikulmat ovat teräviä, niin sen kaikki tasokulmat ovat teräviä.**

Seuraa toisesta kosinilauseesta.

**12. Jokaisessa tetraedrissa on ainakin yksi triedri, jossa kaikki tasokulmat ovat teräviä.**

Tetraedrin kaikkien neljän triedrin tasokulmien summa on  $4 \cdot 180^\circ$ . Ainakin yhden triedrin tasokulmien summan on oltava  $\leq 180^\circ$ . Selvästikin triedrin jokainen tasokulma on pienempi kuin kahden muun summa, joten tällaisessa triedrissä ei voi olla tylppiä kulmia.

**13. Kolmitahkoisen prisman voi aina leikata tasolla niin, että leikkauskuvio on tasasivuinen kolmio.**

Olkoon  $ABC$  prisman särmiä vastaan kohtisuora leikkaus,  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ . Oletetaan, että  $a \geq b$ ,  $c \geq b$ . Olkoon  $AB_1C_1$  mielivaltainen leikkaus, olkoon  $BB_1 = x$  ja  $CC_1 = y$ . Kolmio  $AB_1C_1$  on tasasivuinen, jos  $c^2 + x^2 = b^2 + y^2 = a^2 + (x - y)^2$ . Edellisen yhtälön toteuttavat lukuparit  $(x, y)$  sijaitsevat käyrällä, joka leikkaa  $y$ -akselin pisteessä  $\sqrt{c^2 - b^2}$  ja lähestyy suoraa  $y = x$ , kun  $x$  kasvaa. Yhtälön  $b^2 + y^2 = a^2 + (x - y)^2$  eli  $x(2y - x) = a^2 - b^2$  ratkaisut taas ovat käyrällä, joka lähestyy suoraa  $y = 0$ , kun  $x \rightarrow 0$  ja suoraa  $y = \frac{x}{2}$ , kun  $x \rightarrow \infty$ . Käyrät leikkaavat.

**14.** Jokaisella tetraedrilla on ainakin yksi kärki, josta lähtevät särmät voivat olla kolmion sivut.

Olkoon tetraedrin pisin särmä  $a$ , sen toisesta päätepisteestä lähtevät särmät  $b$  ja  $c$  ja toisesta  $e$  ja  $f$ . Voidaan olettaa, että  $a$ ,  $b$  ja  $e$  ovat kolmion sivut samoin kuin  $a$ ,  $c$  ja  $f$ . Mutta silloin  $0 < (b + e - a) + (c + f - a) = (b + c - a) + (e + f - a)$ . Positiivisen summan kahdesta yhteenlaskettavasta ainakin toisen on oltava positiivinen. Siis joko  $a$ ,  $b$  ja  $c$  tai  $a$ ,  $e$  ja  $f$  voivat olla kolmion sivut.

**15.** Jos suora  $\ell$  muodostaa kolmen keskenään kohtisuoran suoran kanssa terävät kulmat  $\alpha$ ,  $\beta$  ja  $\gamma$ , niin  $\alpha + \beta + \gamma < 180^\circ$ .

Hahmotetaan suora  $\ell$  suorakulmaisen särmiön lävistäjäksi; kulmat  $\alpha$ ,  $\beta$  ja  $\gamma$  ovat lävistäjän kulmat särmiön kolmen erisuuntaisen särmän kanssa. Kun kolme yhtenevää suorakulmaista särmiötä kiinnitetään yhteen yhtä pitkiä särmiä myöten niin, että särmiöillä on yksi yhteinen kärki, saadaan tästä kärjestä lähtevien kolmen lävistäjän väliseksi kulmiksi  $2\alpha$ ,  $2\beta$  ja  $2\gamma$ . Väite seuraa numeron 7 tuloksesta.

**16.** Jokaisen tetraedrin ympäri voidaan piirtää pallo. Jokaisen tetraedrin sisään voidaan piirtää pallo.

Tetraedrin  $ABCD$  sivutahkon  $ABC$  ympäri piirretyn ympyrän keskipisteen  $O$  kautta kulkevan tasoa  $ABC$  vastaan kohtisuoran suoran  $\ell$  jokainen piste on yhtä etäällä  $A$ :sta,  $B$ :stä ja  $C$ :stä. Tason  $\tau$ , joka on kohtisuorassa  $AD$ :tä vastaan ja kulkee  $AD$ :n keskipisteen kautta, jokainen piste on yhtä etäällä  $A$ :sta ja  $B$ :stä.  $\tau$ :n ja  $\ell$ :n leikkauspiste on yhtä etäällä tetraedrin kaikista kärjistä ja siis tetraedrin ympäri piirretyn pallon keskipiste.

Diedrikulman puolittajataso jokainen piste on yhtä etäällä diedrin kyljistä. Tetraedrin kärkeen  $A$  liittyvän triedrin kahden eri diedrikulman puolittajatasojen leikkaussuoran  $\ell$  jokainen piste on yhtä etäällä kaikista kolmesta triedrin tahkosta. Tetraedrin toiseen kärkeen liittyy triedri, jonka kaikki diedrit eivät ole samoja kuin toiseen kärkeen liittyvät. Löytyy diedrin puolittajataso  $\tau$ , jonka leikkauspiste  $\ell$ :n kanssa on yhtä etäällä tetraedrin kaikista neljästä tahkosta.

**17.** Tetraedrin sisään ja ympäri piirrettyjen pallojen säteille  $r$  ja  $R$  pätee  $R > 3r$ .

Tetraedrin sivujen painopisteet kärkinä muodostettu tetraedri on alkuperäisen kanssa yhdenmuotoinen suhteessa  $1 : 3$ . Pienemmän tetraedrin ympäri piirretyn pallon säde on siis  $\frac{R}{3}$ . Mutta tämä  $\frac{R}{3}$ -säteinen pallo koskettaa tai leikkaa jokaista isomman tetraedrin sivutahkoa, joten  $\frac{R}{3} \geq r$ .

**18.** Jos tetraedrin särmistä viiden pituus on  $\leq 1$ , niin tetraedrin tilavuus on  $\leq \frac{1}{8}$ .

Tarkastellaan kolmioita  $ABC$  ja  $BCD$ , joiden jokainen sivu on  $\leq 1$ . Silloin  $ABC$  ja  $BCD$  voidaan kokonaan peittää sellaisilla tasasivuisilla kolmioilla, joiden sivut ovat yksikön pituisia. Tällaisen kolmion ala on  $A \leq \frac{1}{4}\sqrt{3}$  ja korkeus  $h \leq \frac{1}{2}\sqrt{3}$ . Tetraedrin  $ABCD$  tilavuus on pienempi kuin  $\frac{1}{3}Ah = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{8}$ .

**19.** Jos pallon säde on  $r$  ja sen kalotin korkeus  $s$ , niin kalotin ala on  $2\pi rs$ .

Ala lasketaan täsmällisesti integroimalla. Tehdään tässä kuitenkin kaava uskottavaksi seuraavalla alkuaan Blaise Pascalin päättelyllä. Kootaan kalotti ohuista suikaleista, joiden leveys on  $\Delta s$ . Jos kalotti ajatellaan  $x$ -akseli akselina syntyneeksi pyörähdysskappaleeksi, niin suikaleen säde on  $y$ . Jos suikaleen projekstio  $x$ -akselilla on  $\Delta x$ , saadaan yhdenmuotoisista suorakulmaisista kolmioista  $\frac{\Delta x}{\Delta s} = \frac{y}{r}$ . Suikaleen ala on  $2\pi y \Delta s = 2\pi r \Delta x$ , joten kalotin ala on  $2\pi \sum \Delta s = 2\pi r \sum \Delta x$ . Koska  $\sum \Delta x = s$ , kaava seuraa.

**20.** Pallon  $\mathcal{P}_1$  keskipiste on  $M$ ;  $P$  on  $\mathcal{P}_1$ :n ulkopuolella. Pallo  $\mathcal{P}_2$  kulkee pisteen  $M$  kautta ja sen keskipiste on  $P$ . Silloin  $\mathcal{P}_2$ :n pinnan  $\mathcal{P}_1$ :n sisälle jäävän osan suuruus ei riipu pisteen  $P$  sijainnista.

Tarkastellaan pallojen leikkausta suoran  $MP$  kautta kulkevassa tasossa. Olkoot  $\mathcal{C}_1$  sekä  $\mathcal{C}_2$  tason ja  $\mathcal{P}_1$ :n sekä  $\mathcal{P}_2$ :n leikkausympyrät ja olkoot  $A$  ja  $B$  näiden ympyröiden leikkauspisteet. Olkoon vielä  $C$   $AB$ :n ja  $MP$ :n leikkauspiste ja  $D$   $AM$ :n keskipiste. Jos  $MC = s$ ,  $AM = R$  ja  $AP = r$ , niin tehtävässä kysytty ala on  $2\pi rs$ . Mutta kehäkulmalauseen perusteella  $\angle MAP = \angle APD$ . Yhdenmuotoisista kolmioista  $AMC$  ja  $APD$  saadaan  $\frac{s}{AM} = \frac{AD}{r}$  eli  $sr = \frac{1}{2}R^2$ . Ala ei riipu  $P$ :n sijainnista (ja on itse asiassa  $\mathcal{P}_1$ :n isoympyrän ala).

**21.**  $R$ -säteisen pallon kolmen isoympyrän rajaaman kolmion ala on  $(A + B + C - \pi)R^2$ , missä  $A$ ,  $B$  ja  $C$  ovat kolmion kulmat radiaaneissa lausuttuina.

Pallokolmion kulmat ovat sen sivujen isoympyröiden tasojen määräämät diedrikulmat. Kahden toisensa kulmassa  $\alpha$  leikkaavan isoympyrätason määrittämän pallokaksikulmion ala on  $\frac{A}{2\pi} \cdot 4\pi R^2$ . Kaksi leikkaavaa tasoa synnyttää kaksi symmetristä pallokaksikulmiota, joiden yhteinen ala on  $\frac{A}{\pi} \cdot 4\pi R^2$ . Pallokolmion kärkiin liittyvät kolme pallokaksikulmioparia peittävät pallon pinnan kertaalleen, paitsi pallokolmio ja sen kanssa pallon keskipisteen suhteen symmetrinen kolmio tulevat peitetyksi kolmesti. Jos pallokolmion ala on  $T$ , on siis  $\left(\frac{A}{\pi} + \frac{B}{\pi} + \frac{C}{\pi}\right) \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^2 + 4T$ . Tästä ratkaistaan  $T = (A + B + C - \pi)R^2$ .

**22.** Jokaiselle kuperalle monitahokkaalle pätee  $v - e + s = 2$ , missä  $v$ ,  $e$  ja  $s$  ovat monitahokkaan kärkien, särmien ja sivutahkojen lukumäärät. (Eulerin monitahokaskaava).

Sijoitetaan yksikkösäteinen pallo niin, että sen keskipiste on monitahokkaan sisällä. Projisoidaan monitahokas pallon keskipisteestä pallolle. Monitahokkaan sivutahko, joka on  $k$ -kulmio, jakautuu  $k - 2$ :ksi kolmioksi. Niiden projektion pinta-ala on palloylijäämälauseen mukaan projektiomonikulmion kulmasumma vähennettynä  $(k - 2)\pi$ :llä. Kaikkien projektiomonikulmioiden yhteinen kulmasumma on  $2\pi v$ . Siis  $4\pi = 2\pi v + 2\pi s - \sum n_j \pi$ , missä  $n_j$  on  $j$ :nnen monikulmion sivuluku. Koska jokainen sivu kuuluu kahteen monikulmioon,  $\sum n_j = 2e$ . Eulerin kaava seuraa.

**23.** On olemassa tasan viisi säännöllistä monitahokasta: säännöllinen tetraedri, kuutio (heksaedri), oktaedri, ikosaedri ja dodekaedri (Platonin kappaleet).

Samoin kuin numerossa 7 voidaan todistaa, että kuperan sopen tasokulmien summa on  $< 360^\circ$ . Säännöllisen monikulmion sivutahkot ovat säännöllisiä  $n$ -kulmioita. Säännöllisen  $n$ -kulmion kulmien suuruus on  $\frac{n-2}{n} \cdot 180^\circ$ . Joka kärjessä kohtaa  $k$  tällaista monikulmiota, ja  $k \geq 3$ . On siis oltava  $\frac{k(n-2)}{n} \cdot 180^\circ < 360^\circ$  eli  $k < \frac{2n}{n-2}$ . Ehto  $3 \leq k$  johtaa epäyhtälöön  $n < 6$ . Säännöllisen monitahokkaan sivutahkot ovat enintään 5-kulmioita. Jos  $n = 3$ ,  $k < 6$ ,  $n = 4$  antaa  $k < 4$ , samoin  $n = 5$  merkitsee, että  $k < \frac{10}{3} < 4$ . Koska jokainen kärki kuuluu  $k$ :hon sivutahkoon ja sivutahko- $n$ -kulmioilla on  $ns$  kärkeä, on  $v = \frac{ns}{k}$ . Jokainen särmä puolestaan kuuluu kahteen sivutahkoon; sivutahko- $n$ -kulmioilla on  $ns$  sivua. Siis  $e = \frac{ns}{2}$ . Eulerin kaavan mukaan  $\frac{ns}{k} - \frac{ns}{2} + s = 2$ , josta ratkaistaan  $s = \frac{4k}{2k - (k-2)n}$ . Ainoat mahdollisuudet ovat siis taulukon

$n$	$k$	$s$	$e$	$v$
3	3	4	6	4
3	4	8	12	6
3	5	20	30	12
4	3	6	12	8
5	3	12	30	20

mukaiset. Jokainen taulukossa kuvattu monitahokas on myös olemassa: järjestyksessä säännöllinen tetraedri, säännöllinen oktaedri, säännöllinen ikosaedri, kuutio ja säännöllinen dodekaedri.

**24.** Jos jokainen pinnan  $\mathcal{P}$  tasoleikkaus on tyhjä, piste tai ympyrä, niin  $\mathcal{P}$  on pallo.

Koska  $\mathcal{P}$  on pinta, voidaan olettaa, että siihen kuuluu ainakin kolme pistettä  $A$ ,  $B$  ja  $C$ . Tason  $ABC$  ja  $\mathcal{P}$ :n leikkaus on ympyrä  $\mathcal{C}$ . Valitaan kaksi  $\mathcal{C}$ :n keskenään kohtisuoraa halkaisijaa  $AD$  ja  $EF$  ja asetetaan  $AD$ :n ja  $EF$ :n kautta tasoa  $ABC$  vastaan kohtisuorat tasot  $\tau_1$  ja  $\tau_2$ .  $\tau_1$ :n ja  $\mathcal{P}$ :n leikkaus on ympyrä  $\mathcal{C}_1$  ja  $\tau_2$ :n ja  $\mathcal{P}$ :n leikkaus on ympyrä  $\mathcal{C}_2$ . Molemmille ympyröille yhteisiä ovat  $\tau_1$ :n ja  $\tau_2$ :n leikkaussuoran ja  $\mathcal{P}$ :n yhteiset pisteet  $G$ ,  $N$  ja  $S$ . Tästä seuraa, että molemmat ympyrät ovat yhtenevien kolmioiden  $ADN$  ja  $EFN$  ympäri piirrettyjä ympyröitä, joten niillä on sama halkaisija  $NS$ . Pinnan  $\mathcal{P}$  mielivaltaisen pisteen  $P$  sekä pisteiden  $N$  ja  $S$  kautta kulkeva taso leikkaa  $\mathcal{C}$ :n pitkin halkaisijaa  $GH$ .  $N$ :n  $S$ :n ja  $P$ :n kautta kulkeva ympyrä on kolmion  $GHN$  ympäri piirretty ympyrä, joten sekin on halkaisijaltaan  $NS$ .  $P$  on siis  $NS$ -halkaisijaisen pallon pinnan piste.

**25.** Jos kolme ympyrää sivuaa toisiaan kolmessa eri pisteessä, niin ympyrät ovat joko samassa tasossa tai saman pallon pinnalla. [Suora on ympyrän tangentti, jos se on samassa tasossa kuin ympyrä ja jos suoralla ja ympyrällä on yksi ja vain yksi yhteinen piste. Kaksi ympyrää sivuaa toisiaan, jos niillä on yhteinen tangentti.]

Oletetaan, että ympyrät  $C_i$ ,  $i = 1, 2, 3$ , eivät ole samassa tasossa. Silloin mitkään kaksi niistä eivät ole samassa tasossa. Olkoon  $P_{ij}$   $C_i$ :n ja  $C_j$ :n sivuamispiste. Ympyröiden keskipisteiden kautta kulkevat ympyröiden tasoja vastaan kohtisuorat suorat  $\ell_1$ ,  $\ell_2$  ja  $\ell_3$  ovat pareittain samoissa tasoissa (sivuamispisteiden ja ympyröiden keskipisteiden määrittämät tasot). Koska  $\ell_1$ :n ja  $\ell_2$ :n leikkauspisteen  $Q_{12}$  etäisyys pisteistä  $P_{13}$  ja  $P_{23}$  on sama,  $Q_{12}$  on mainittujen pisteiden keskinormaalitasossa samoin kuin  $\ell_3$ . Tämä on mahdollista vain, jos  $\ell_1$ :n ja  $\ell_3$ :n leikkauspiste on juuri  $Q_{12}$ . Mutta näin onkin tultu siihen, että kaikki kolme ympyrää ovat samalla  $Q_{12}$ -keskisellä pallolla.