

# Kansainvälisten matematiikkaolympialaisten tehtävien ratkaisuja 1975–94

**75.1.** Todistettava väite on sama kuin

$$\sum_{i=1}^n x_i z_i \leq \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Merkitään  $S_0 = T_0 = 0$  ja

$$S_k = \sum_{i=1}^k y_i, \quad T_k = \sum_{i=1}^k z_i.$$

Koska luvut  $y_i$  ovat laskevassa suuruusjärjestyksessä, mutta luvut  $z_i$  mahdollisesti muussa järjestyksessä, on  $S_k \geq T_k$  kaikilla  $k$ , mutta  $S_n = T_n$ . Koska  $x_i - x_{i+1} \geq 0$ , saadaan

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_i y_i &= \sum_{i=1}^n x_i (S_i - S_{i-1}) = x_n S_n + \sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1}) S_i \\ &\geq x_n T_n + \sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1}) T_i = \sum_{i=1}^n x_i (T_i - T_{i-1}) = \sum_{i=1}^n x_i z_i. \end{aligned}$$

**75.2.** Tarkastellaan jonon lukujen jakojäännöksiä modulo  $a_1$ . Jokin jakojäännös, esimerkiksi  $r$ ,  $0 \leq r < a_1$ , esiintyy äärettömän monta kertaa. Olkoot tämän jakojäännöksen antavat eri luvut  $a_{k_i} = q_i a_1 + r$ ,  $i = 1, 2, \dots$ . Silloin  $a_{k_1} \neq a_1$ , ja kun  $i > 1$  on  $a_{k_i} = (q_i - q_1) a_1 + q_1 a_1 + r = x a_1 + y a_{k_1}$ , missä  $x = q_i - q_1 > 0$  ja  $y = 1$ .

**75.3.** Valitaan tason suunnistus niin, että vektorien  $\overrightarrow{AB}$  ja  $\overrightarrow{AC}$  välinen kulma on positiivinen. Olkoot  $f$  ja  $g$  tason kierrot  $45^\circ$  vastapäivään ja myötäpäivään. Väitös voidaan kirjoittaa muotoon  $f(\overrightarrow{RP}) = g(\overrightarrow{RQ})$ . Piirretään apukuvioksi  $ABC$ :n ulkopuolelle tasasiivinen kolmio  $BAS$ . Tehtävän kulmaehdoista nähdään, että kolmiot  $SBR$ ,  $BPC$ ,  $ACQ$  ja  $ASR$  ovat yhdenmuotoiset. Lisäksi nähdään, että  $f(\overrightarrow{RB}) = a\overrightarrow{SB}$ ,  $f(\overrightarrow{BP}) = b\overrightarrow{BC}$ ,  $g(\overrightarrow{RA}) = c\overrightarrow{SA}$  ja  $g(\overrightarrow{AQ}) = d\overrightarrow{AC}$  joillakin positiivisilla luvuilla  $a, b, c$  ja  $d$ . Mainitusta yhdenmuotoisuudesta ja kolmioiden  $SBR$  ja  $ASR$  yhtenevyydestä seuraa, että  $a = b = c = d$ . Mutta koska kierrot  $f$  ja  $g$  ovat lineaarisia kuvauksia, on

$$\begin{aligned} f(\overrightarrow{RP}) &= f(\overrightarrow{RB}) + f(\overrightarrow{BP}) = a\overrightarrow{SB} + a\overrightarrow{BC} = a\overrightarrow{SC}, \\ g(\overrightarrow{RQ}) &= g(\overrightarrow{RA}) + g(\overrightarrow{AQ}) = a\overrightarrow{SA} + a\overrightarrow{AC} = a\overrightarrow{SC}. \end{aligned}$$

**75.4.** Jos  $f(x)$  on luvun  $x$  numeroiden summa, niin tunnetusti  $f(x) \equiv x \pmod{9}$ . Siis

$$f(B) \equiv B = f(A) \equiv A = f(4444^{4444}) \equiv 4444^{4444} \pmod{9}.$$

Mutta modulo 9 on  $4444 \equiv 7$ ,  $7^2 \equiv 4$  ja  $7^3 \equiv 1$ ; koska  $4444 \equiv 1 \pmod{3}$ , on edelleen  $4444^{4444} \equiv 7 \pmod{9}$ . Arvioidaan vielä luvun  $f(B)$  suuruutta: koska  $4444^{4444} < 10^{4 \cdot 5000}$ , on varmasti  $A < 9 \cdot 20\,000 = 180\,000$  ja  $B = f(A) < 1 + 5 \cdot 9 = 46$  sekä  $f(B) < 4 + 9 = 13$ . Ainoa 13:a pienempi positiivinen kokonaisluku, joka on  $\equiv 7 \pmod{9}$  on 7. Siis  $f(B) = 7$ .

**75.5.** Etsitään pisteitä muodossa  $(\cos 2\alpha, \sin 2\alpha)$ . Kahden tällaisen pisteen etäisyys on

$$\begin{aligned}\sqrt{(\cos 2\alpha - \cos 2\beta)^2 + (\sin 2\alpha - \sin 2\beta)^2} &= \sqrt{2 - 2\cos 2(\alpha - \beta)} \\ &= 2|\sin(\alpha - \beta)| = 2|\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta|.\end{aligned}$$

Jos löydetään 1975 eri kulmaa, joiden sekä sini että kosini ovat rationaalisia, niin tehtävä on ratkaistu. Mutta tällainen valinta onnistuu asettamalla esimerkiksi

$$\cos \alpha_k = \frac{k^2 - 1}{k^2 + 1}, \quad \sin \alpha_k = \frac{2k}{k^2 + 1},$$

$$k = 1, 2, \dots, 1975, \quad 0 < \alpha_k < \frac{\pi}{2}.$$

**75.6.** Oletamme, että  $P$  on eräs tehtävän ehdot täyttävä polynomi. Asetetaan  $Q(x) = P(x, 1 - x)$ . Silloin  $Q(1) = 1$ . Jos tehtävän toiseen ehtoon sijoitetaan  $a = x$ ,  $b = y$  ja  $c = 1 - x - y$ , saadaan

$$Q(x + y) + Q(1 - x) + Q(1 - y) = 0. \quad (1)$$

Kun tässä  $x$ :ää pidetään muuttujana ja  $y$ :tä vakiona, saadaan derivaattayhtälö

$$Q'(x + y) = Q'(1 - x);$$

erityisesti, kun  $x = 0$ , saadaan  $Q'(y) = Q'(1)$ . Tämä on mahdollista vain, jos  $Q(y) = my + n$ , missä  $m$  ja  $n$  ovat vakioita. Kun (1):een sijoitetaan  $x = y = 0$ , saadaan  $n = Q(0) = -2Q(1) = -2$ , ja  $m = Q(1) - n = 3$ . Tehtävän homogeenisuusehto antaa

$$\begin{aligned}P(x, y) &= (x + y)^n P\left(\frac{x}{x + y}, 1 - \frac{x}{x + y}\right) \\ &= (x + y)^n \left(3\frac{x}{x + y} - 2\right) = (x - 2y)(x + y)^{n-1}.\end{aligned}$$

– Toisaalta on helppo todentaa, että tällaiset polynomit täyttävät tehtävän ehdot.

**76.1.** Olkoon etsitty nelikulmio  $ABCD$  ja olkoon  $AC$  lävistäjä, jonka pituutta  $x$  haetaan. Piirretään pisteiden  $B$  ja  $D$  kautta  $AC$ :n suuntaiset suorat  $l_1$  ja  $l_2$ . Koska nelikulmion ala on 32, suorien etäisyys on  $\frac{64}{x}$ . Olkoon  $A'$  pisteen  $A$  peilikuva suoran  $l_1$  suhteen ja  $C'$  pisteen  $C$  peilikuva suoran  $l_2$  suhteen. Silloin  $|A'C'| \leq |A'B| + |BD| + |DC'| = |AB| + |BD| + |DC| = 16$ , ja yhtäsuuruus vallitsee silloin ja vain silloin, kun  $A'$ ,  $B$ ,  $D$  ja  $C'$  ovat samalla suoralla. Mutta  $A'C'$  on sellaisen kolmion hypotenuusa, jonka kateetit ovat  $x$  ja  $\frac{128}{x}$ . Siis

$$x^2 + \left(\frac{128}{x}\right)^2 \leq 256$$

eli

$$\left(x - \frac{128}{x}\right)^2 \leq 0.$$

Ainoa positiivinen  $x$ , jolle viimeinen epäyhtälö voi toteutua on  $x = \sqrt{128}$ .

**76.2.** Jos  $|x| > 2$ , niin  $P_1(x) - x = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 2 > 0$  ja  $P_1(x) > 2$ .

Tehdään induktio-oletus: kun  $|x| > 2$ , niin  $P_j(x) > x$  ja  $P_j(x) > 2$ . Silloin  $P_{j+1}(x) = P_1(P_j(x)) > P_j(x)$ . Siis  $P_{j+1}(x) > x$  ja  $P_{j+1}(x) > 2$ . Yhtälöllä  $P_j(x) = x$  ei siis voi olla ratkaisuja  $x$ , joissa  $|x| > 2$ . Kaikki yhtälön ratkaisut ovat muotoa  $x = 2 \cos t$  jollain  $t$ . Mutta  $P_1(2 \cos t) = 4 \cos^2 t - 2 = 2 \cos 2t$  ja siten yleisesti  $P_j(2 \cos t) = 2 \cos(2^j t)$ . Yhtälö  $P_j(x) = x$  palautuu yhtälöksi  $\cos(2^j t) = \cos t$ . Tämän yhtälön juuret saadaan kaavoista

$$2^j t = t + 2n\pi, \quad 2^j t = -t + 2n\pi,$$

eli

$$t = \frac{2n\pi}{2^j - 1}, \quad n = 0, 1, \dots, 2^{j-1} - 1,$$

$$t = \frac{2n\pi}{2^j + 1}, \quad n = 1, 2, \dots, 2^{j-1}.$$

Koska polynomien  $P_j$  aste on  $2^j$ , tehtävän väite tulee todistetuksi, jos osoitetaan, että kaikki saadut juuret  $x = 2 \cos t$  ovat keskenään eri suuret. Kosinifunktio on aidosti vähenevä välillä  $[0, \pi]$ , joten riittää, kun osoitetaan, että

$$\frac{2n}{2^j - 1} \neq \frac{2m}{2^j + 1}$$

kun  $0 \leq n \leq 2^{j-1} - 1$  ja  $1 \leq m \leq 2^{j-1}$ . Mutta yhtälöstä  $\frac{2n}{2^j - 1} = \frac{2m}{2^j + 1}$  seuraisi  $2^j(m - n) = m + n$ , mikä on mahdotonta, koska  $m + n \leq 2^j - 1$ .

**76.3.** Olkoot laatikon sivujen pituudet  $a_1, a_2$  ja  $a_3$ ,  $a_1 \leq a_2 \leq a_3$ . Asetetaan  $b_i = \left\lceil \frac{a_i}{\sqrt[3]{2}} \right\rceil$ .

Laatikkoon mahtuu  $b_1 b_2 b_3$  kappaletta kuutioita, joiden tilavuus on 2; näiden kuutioiden yhteenlaskettu tilavuus on  $2b_1 b_2 b_3$ . Jotta kuutioiden tilavuus olisi 40 % laatikon tilavuudesta, on oltava

$$\frac{a_1 a_2 a_3}{b_1 b_2 b_3} = 5.$$

Pieniä  $a$ :n arvoja vastaavat lukujen  $b = \left\lceil \frac{a}{\sqrt[3]{2}} \right\rceil$  ja  $a/b$  arvot ovat

$$\begin{array}{l} a : \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \\ b : \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \\ \\ \frac{a}{b} : \quad 2 \quad \frac{3}{2} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{5}{3} \quad \frac{3}{2} \quad \frac{7}{5} \end{array}$$

Jos  $a \geq 8$ , niin  $b \geq 6$  ja

$$\frac{a}{b} < \left(1 + \frac{1}{b}\right) \sqrt[3]{2} \leq \frac{7}{6} \sqrt[3]{2} < \frac{3}{2}.$$

Jos  $a_1 > 2$ , niin  $\frac{a_i}{b_i} \leq \frac{5}{3}$ , ja

$$\frac{a_1 a_2 a_3}{b_1 b_2 b_3} < 5.$$

Siis  $a_1 = 2$ . Jos nyt myös  $a_2 = 2$ , on oltava  $\frac{a_3}{b_3} = \frac{5}{4} < \sqrt[3]{2}$ . Tämä on mahdotonta, joten  $a_2 \geq 3$ . Jos  $a_2 = 3$ , niin  $\frac{a_3}{b_3} = \frac{5}{3}$ , eli  $a_3 = 5$ . Jos olisi  $a_2 = 4$ , olisi  $\frac{a_3}{b_3} = \frac{15}{8} > \frac{5}{3}$ , mikä on mahdotonta. Jos  $a_2 = 5$ , on oltava  $\frac{a_3}{b_3} = \frac{3}{2}$ , eli  $a_3 = 6$ . Jos olisi  $a_2 \geq 6$ , olisi  $\frac{a_2 a_3}{b_2 b_3} \leq \frac{9}{4} < \frac{5}{2}$ , mikä on myös mahdotonta. Mahdolliset särmiön sivujen pituudet ovat siis  $(2, 3, 5)$  ja  $(2, 5, 6)$ .

**76.4.** Tehtävän lukujen  $a_1, a_2, \dots$  joukossa ei saa esiintyä lukua 1, koska yhteenlaskettavien tulo suurenee, jos jokin tekijöistä  $a_i$  korvataan  $(a_i + 1)$ :llä. Maksimaalisen tulon antavissa yhteenlaskettavissa ei saa esiintyä lukua  $2k$ ,  $k > 2$ , koska tällainen yhteenlaskettava voitaisiin korvata  $k$ :lla kakkosella;  $2k < 2^k$ . Yhteenlaskettavissa ei voi myöskään olla lukua  $2k + 3$ ,  $k \geq 1$ , koska  $k$ :n kakkosen ja kolmosen tulo on  $> 2k + 3$ . Yhteenlaskettava 4 voidaan korvata  $(2 + 2)$ :lla muuttamatta summaa tai tuloa. Maksimaalinen tulo on siis muotoa  $2^r 3^s$ , missä  $2r + 3s = 1976$ . Siis

$$2^r 3^s = 2^r 3^{\frac{1976-2r}{3}} = 3^{\frac{1976}{3}} (2 \cdot 3^{-\frac{2}{3}})^r.$$

Viimeinen tulon tekijä on ykköstä pienempi, joten tulo maksimoituu, kun  $r$  valitaan mahdollisimman pieneksi, ts.  $r = 1$ . Maksimaalinen tulo on  $2 \cdot 3^{658}$ .

**76.5.** Sovelletaan laatikkoperiatetta. Itseisarvoltaan enintään  $p$  olevia kokonaislukuja on  $2p + 1$  kappaletta ja  $q$ :n tällaisen kokonaisluvun jonoja on  $(2p + 1)^q = (4p^2 + 4p + 1)^p = (2pq + 2q + 1)^p$  kappaletta. Jos kaikki  $|x_i|$ :t ovat  $\leq p$ , niin yhtälöiden

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1q}x_q &= y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2q}x_q &= y_2 \\ &\vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \dots + a_{pq}x_q &= y_p \end{aligned}$$

määrittämät luvut  $y_j$  ovat kokonaislukuja ja  $|y_j| \leq pq$ . Jonoja  $(y_1, y_2, \dots, y_p)$  on siis enintään  $(2pq + 1)^p$  kappaletta. Ainakin kahden eri  $x_i$ -jonon, esimerkiksi jonojen  $(s_1, s_2, \dots, s_q)$  ja  $(t_1, t_2, \dots, t_q)$ , on tuotettava sama  $y_j$ -jono. Mutta tällöin  $x_i = t_i - s_i$  on tehtävän ehdot täyttävä yhtälöryhmän ratkaisu: ainakin yksi  $x_i$  on  $\neq 0$  ja  $|x_i| \leq |t_i| + |s_i| \leq 2p = q$ .

**76.6.** Merkitään

$$a_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}, \quad n = 0, 1, \dots,$$

jolloin  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 1$ ,

$$a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1}$$

ja

$$a_n - 2a_{n-1} = (-1)^{n-1}.$$

Osoitetaan induktiolla, että

$$u_n = 2^{a_n} + 2^{-a_n} \quad (1)$$

kaikilla  $n$ . Yhtälö (1) on tosi, kun  $n = 0$  ja  $n = 1$ . Oletetaan, että (1) on tosi kaikilla  $n \leq k$ . Silloin

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= (2^{a_k} + 2^{-a_k})(2^{2a_{k-1}} + 2^{-2a_{k-1}}) - \frac{5}{2} \\ &= 2^{a_k+2a_{k-1}} + 2^{-(a_k+2a_{k-1})} + 2^{2a_{k-1}-a_k} + 2^{a_k-2a_{k-1}} - \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Oikean puolen kolmannen ja neljännen yhteenlaskettavan eksponentit ovat 1 ja  $-1$  tai  $-1$  ja 1, joten

$$u_{k+1} = 2^{a_{k+1}} + 2^{-a_{k+1}} + 2 + \frac{1}{2} - \frac{5}{2}.$$

Induktioperiaatteen nojalla  $u_n = 2^{a_n} + 2^{-a_n}$  kaikilla  $n$ . Koska  $a_n \geq 1$ , kun  $n \geq 1$ ,  $[u_n] = 2^{a_n}$ , kuten väitettiin.

**77.1.** Olkoon  $O$  neliön  $ABCD$  keskipiste. Voidaan olettaa, että neliön sivu on 1. Kolmio  $LOK$  on tasasivuinen suorakulmainen kolmio, jonka kateettien pituus on  $\frac{1}{2}(\sqrt{3}-1)$   $LK$ :n (ja symmetrian vuoksi myös  $LM$ :n,  $MN$ :n ja  $NK$ :n) keskipisteen etäisyys  $O$ :sta on siten  $\frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}-1)$ . Pythagoraan lauseen nojalla myös sivun  $AK$  (ja muiden kolmionsivujen) keskipisteen etäisyys  $O$ :sta on

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}-1).$$

Kaikki tutkittavat 12 pistettä ovat samalla  $O$ -keskisellä ympyrällä.

Merkitään  $BK$ :n keskipistettä  $X$ :llä,  $CM$ :n keskipistettä  $Y$ :llä,  $KN$ :n keskipistettä  $Z$ :lla ja  $CL$ :n keskipistettä  $T$ :llä. Koska kolmio  $BCL$  on tasasivuinen, kulman  $LBC$  puolittaja  $BK$  kulkee  $T$ :n kautta. Pisteet  $X$  ja  $Y$  ovat yhtä etäällä  $BC$ :stä, joten  $XY \parallel BC$  ja siis  $\angle YXK = \angle YXT = 30^\circ$ . Olkoon  $\angle XON = \alpha$ . Vastapäivään tehty  $90^\circ$  kierto  $O$ :n ympäri vie  $X$ :n  $T$ :ksi ja  $N$ :n  $K$ :ksi. Siten  $\angle TOK = \alpha$ . Lisäksi  $ON \perp YX$ , mistä seuraa, että  $\angle NOY = \alpha$ . Koska kulma  $NOK$  on suora,  $2\alpha + 60^\circ = 90^\circ$ . Siis  $\angle XON = 2\alpha = 30^\circ$ . Helposti nähdään vielä, että  $OZ$  on kulman  $NOK$  ja myös kulman  $YOT$  puolittaja, mistä seuraa  $\angle YOZ = \angle ZOT = 30^\circ$ . Symmetrian nojalla kaikki 12 pistettä ovat  $30^\circ$ :een päässä toisistaan, ja siis säännöllisen 12-kulmion kärjissä.

**77.2.** Jos jonossa olisi 17 termiä, olisi

$$0 > (x_1 + x_2 + \dots + x_7) + (x_2 + x_3 + \dots + x_8) + \dots + (x_{11} + x_{12} + \dots + x_{17}) \\ = (x_1 + x_2 + \dots + x_{11}) + (x_2 + x_3 + \dots + x_{12}) + \dots + (x_7 + x_8 + \dots + x_{17}) > 0.$$

Jonossa ei voi olla 17:ää termiä. Termejä voi olla 16. Sen osoittaa jono 5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5, -13, 5, 5, 5, -13, 5, 5.

**77.3.** Jos  $n = 2$ , luku  $9 \cdot 25 = 15^2$  on vaadittua muotoa: luvuilla 9, 15 ja 25 on kullakin vain yksi tekijöihinjakotapa.

Oletetaan, että  $n > 2$ . Todetaan, että  $(n-1)^2 \in V_n$ ,  $(2n-1)^2 \in V_n$  ja  $(n-1)(2n-1) \in V_n$ . Koska  $V_n$ :n pienin luku on  $1+n$ , luku  $(n-1)^2$  on varmasti jaoton  $V_n$ :ssä. Jos  $(2n-1)^2 = pq$ ,  $p, q \in V_n$ ,  $p \leq q$ , niin  $p = 1+n$  ja joko  $q = 1+2n$  tai  $q = 1+3n$ . Edellinen vaihtoehto johtaisi ristiriitaan  $2n = 7$  ja jälkimmäinen toteutuu vain, kun  $n = 8$ . Siis  $(2n-1)^2$  on jaoton  $V_n$ :ssä, kun  $n \neq 8$ . Jos  $(n-1)(2n-1) = pq$ ,  $p, q \in V_n$ , on oltava  $p = q = n+1$ . Yhtälö toteutuu vain, kun  $n = 5$ . Kun  $n \neq 5$ , niin  $(n-1)(2n-1)$  on jaoton  $V_n$ :ssä. Kun siis  $n \neq 5$  ja  $n \neq 8$ , luvuksi  $r$  kelpaa

$$r = ((n-1)(2n-1))^2 = (n-1)^2(2n-1)^2.$$

Joukossa  $V_5$  luvuksi  $r$  kelpaa

$$r = (56)^2 = 16 \cdot 196;$$

sekä  $56 = 7 \cdot 8$  että  $196 = 14 \cdot 14 = 7 \cdot 28$  ovat jaottomia  $V_5$ :ssä (samoin kuin aikaisemman perusteella luku  $16 = (5-1)^2$ ). Joukossa  $V_8$  luvuksi  $r$  käy vaikkapa

$$r = (7 \cdot 23)^2 = 49 \cdot 529.$$

**77.4.** Kaikilla  $x$  pätee  $f(x) + f(x + \pi) \geq 0$  eli

$$2 - 2A \cos 2x - 2B \sin 2x \geq 0.$$

Jos merkitään

$$\cos y = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \sin y = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}},$$

saadaan

$$\sqrt{A^2 + B^2} \cos(2x - y) \leq 1$$

kaikilla  $x$ . Kun valitaan  $2x = y$ , saadaan  $A^2 + B^2 \leq 1$ .

Kaikilla  $x$  pätee myös  $f(x) + f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$  eli

$$2 - a(\cos x - \sin x) - b(\cos x + \sin x) \\ = 2 - \sqrt{2}a \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}b \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 0.$$

Samoin kuin edellä tästä johdetaan

$$\sqrt{a^2 + b^2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4} - z\right) \leq \sqrt{2}$$

ja  $a^2 + b^2 \leq 2$ .

**77.5.** Jos  $q^2 + r = 1977$ , niin  $q \leq \lceil \sqrt{1977} \rceil = 44$ . Silloin  $a^2 + b^2 < 44(a + b) + (a + b) = 45(a + b)$ , ja koska  $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ , niin  $(a + b)^2 < 90(a + b)$  eli  $a + b < 90$ . Siis  $r \leq 88$  ja  $q^2 = 1977 - r \geq 1889$ . Tästä seuraa  $q > 43$ . On oltava  $q = 44$  ja  $r = 41$ . Kokonaisluvut  $a$  ja  $b$  toteuttavat yhtälön  $a^2 + b^2 = 44(a + b) + 41$  eli

$$(a - 22)^2 + (b - 22)^2 = 1009.$$

Tutkitaan yhtälön  $x^2 + y^2 = 1009$  ratkaisuja, kun  $x$  ja  $y$  ovat kokonaislukuja ja  $0 \leq x \leq y$ . Silloin on oltava  $y^2 \leq 1009 \leq 2y^2$ . Tämä rajoittaa  $y$ :n välille  $23 \leq y \leq 31$ . Helposti kokeillaan, että vain pari  $x = 15$ ,  $y = 28$  toteuttaa yhtälön. Kysytyt  $a$  ja  $b$  löytyvät nyt yhtälöparien

$$|a - 22| = 15, \quad |b - 22| = 28$$

ja

$$|a - 22| = 28, \quad |b - 22| = 15$$

ratkaisuista  $(37, 50)$ ,  $(7, 50)$ ,  $(50, 37)$  ja  $(50, 7)$ .

**77.6.** Osoitetaan ensin induktiolla, että  $f(k) \geq n$  kaikilla  $k \geq n$ . Asia on selvä, kun  $n = 1$ . Olkoon  $n \geq 1$  ja  $f(k) \geq n$  kaikilla  $k \geq n$ ; olkoon  $k \geq n + 1$ . Koska  $k - 1 \geq n$ , niin  $f(k - 1) \geq n$  ja  $f(f(k - 1)) \geq n$ . Mutta koska  $f(k) > f(f(k - 1))$ , niin  $f(k) \geq n + 1$ . Erityisesti pätee siis  $f(n) \geq n$  kaikilla  $n$ . Oletetaan, että  $f(n) > n$  jollakin  $n$ . Olkoon  $f(m) = \min_{k > n} f(k)$ . Silloin  $m - 1 \geq n$  ja  $f(m - 1) > n$ , sillä jos  $m - 1 > n$ , niin  $f(m - 1) \geq m - 1$  ja jos  $m - 1 = n$ , niin  $f(m - 1) = f(n) > n = m - 1$ . Merkitään  $p = f(m - 1)$ . Mutta silloin  $f(m) > f(f(m - 1)) = f(p)$ , mikä on ristiriidassa  $m$ :n minimiominaisuuden kanssa. Siis  $f(n) = n$  kaikilla  $n$ .

**78.1.** Luku  $1978^n - 1978^m = 1978^m(1978^{n-m} - 1)$  on jaollinen 1000:lla eli  $2^35^3$ :lla. Koska  $1978^m = 2^m989^m$ , niin  $m \geq 3$ . Kun kirjoitetaan  $m + n = 2m + (n - m)$ , nähdään, että  $m + n$  tulee minimoiduksi, jos valitaan  $m = 3$  ja pienin mahdollinen  $d = n - m$ , jolla  $5^3 = 125$  on tekijänä luvussa  $1978^d - 1$ . Käytetään hyväksi yleistä tulosta: jos  $d$  on pienin positiivinen kokonaisluku, jolla  $a^d \equiv 1 \pmod{p}$  ja jos  $a^s \equiv 1 \pmod{p}$ , niin  $d$  on  $s$ :n tekijä. Todistus: jos olisi  $s = qd + r$ , missä  $0 < r < d$ , niin  $a^r \equiv a^{qd}a^r = a^s \equiv 1 \pmod{p}$ , mikä olisi ristiriidassa  $d$ :n minimaalisuuden kanssa. Eulerin lauseen nojalla

$$1978^{\phi(125)} \equiv 1 \pmod{125}.$$

Toisaalta  $\phi(125) = \phi(5^3) = 5^2(5 - 1) = 100$ . Luku  $d$  on jokin luvun 100 tekijöistä 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Lasketaan modulo 125:  $1978 \equiv -22$ ,  $1978^2 \equiv 22^2 = 484 \equiv -16$ ,  $1978^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 6$ ,  $1978^5 \equiv -22 \cdot 6 = -132 \equiv -7$ ,  $1978^{10} \equiv 7^2 = 49$ ,  $1978^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 26$ ,  $1978^{25} \equiv -7 \cdot 26 = -182 \equiv -57$ ,  $1978^{50} \equiv 57^2 = 3249 \equiv -1$ . Pienin ehdon täyttävä  $d$  on siis 100, ja pienin  $m + n = 106$ .

**78.2.** Olkoon tehtävän ”lävistäjän toinen päätepiste”  $X$ . Jos pallon  $S$  keskipiste on  $O$  ja

säde  $r$  sekä  $|\overrightarrow{OP}| = d$ , niin

$$\begin{aligned}
|\overrightarrow{OX}|^2 &= |\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}|^2 \\
&= |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} - 2\overrightarrow{OP}|^2 \\
&= 3r^2 + 4d^2 + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} + 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} \\
&\quad - 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - 4\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} - 4\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP}.
\end{aligned} \tag{1}$$

Mutta koska  $PA$ ,  $PB$  ja  $PC$  ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, on

$$\begin{aligned}
(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} + d^2 = 0, \\
(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP}) &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP} + d^2 = 0, \\
(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP}) &= \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} + d^2 = 0.
\end{aligned}$$

Kun nämä sijoitetaan (1):een, saadaan  $|\overrightarrow{OX}|^2 = 3r^2 - 2d^2$ . Piste  $X$  sijaitsee aina  $O$ -keskisen  $(3r^2 - 2d^2)$ -säteisen pallon pinnalla  $S'$ .

On vielä todistettava, että kaikki tämän pallonpinnan  $S'$  pisteet ovat vaaditunlaisia lävis-täjän toisia päätepisteitä. Olkoon siis  $X$  jokin sellainen piste, että  $|\overrightarrow{OX}|^2 = 3r^2 - 2d^2$ . Jana  $PX$  leikkaa pallon  $S$ ; samoin  $PX$ -halkaisijainen pallo. Valitaan näiden kahden pallon leik-kausympyrältä mielivaltainen piste  $A$ . Täydennetään  $PAX$  suorakulmioksi  $PAXY$ ; tällöin  $\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OX} + \overrightarrow{AP}$  ja  $|\overrightarrow{OY}|^2 = |\overrightarrow{OX}|^2 + |\overrightarrow{AP}|^2 + 2\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{AP} = |\overrightarrow{OX}|^2 + |\overrightarrow{OA}|^2 + 2\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OP} - 2\overrightarrow{OX} \cdot \overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}$ . Kun otetaan huomioon kohtisuoruus  $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{AX} = 0$  eli  $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OX} - |\overrightarrow{OA}|^2 + \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$ , saadaan  $|\overrightarrow{OY}|^2 = 2r^2 - d^2$ . Tarkastellaan suoraa  $PY$  kautta kulkevaa ja vektoria  $\overrightarrow{PA}$  vas-taan kohtisuoraa tasoa; tämän tason  $PY$ -halkaisijainen ympyrä leikkaa ympyrän  $S$  kah-dessa pisteessä. Olkoon toinen niistä  $B$ . Silloin  $\overrightarrow{PB} \perp \overrightarrow{BY}$ . Olkoon  $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OY} - \overrightarrow{PB}$ . Silloin  $PBYC$  on suorakulmio. Osoitetaan, että piste  $C$  on pinnalla  $S$ . Lasketaan samoin kuin edellä  $|\overrightarrow{OC}|^2 = |\overrightarrow{OY}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OP}|^2 - 2\overrightarrow{OY} \cdot \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OY} \cdot \overrightarrow{OP} - 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} = |\overrightarrow{OY}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 + |\overrightarrow{OP}|^2 - 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} - 2\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP} = 2r^2 - d^2 + r^2 + d^2 - 2r^2 = r^2$ . Konstruktion perusteella  $\overrightarrow{PA}$ ,  $\overrightarrow{PB}$  ja  $\overrightarrow{PC}$  ovat kaikki kohtisuorassa toisiaan vastaan ja  $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}$ .

**78.3.** Koska  $g(n) > 1$ , on oltava  $f(1) = 1$ . Olkoon  $n \geq 2$  mielivaltainen ja olkoon  $m$  ehdon  $f(m) < n \leq f(m+1)$  toteuttava luku. Silloin

$$g(m) = f(f(m)) + 1 < f(n) + 1 \leq f(f(m+1)) + 1 = g(m+1).$$

Koska funktioiden  $f$  ja  $g$  arvojoukot ovat erillisiä, on

$$g(m) < f(n) < g(m+1).$$



Lukua  $f(n)$  pienemmät kokonaisluvut ovat näin ollen  $f(1), f(2), \dots, f(n-1), g(1), g(2), \dots, g(m)$ ; koska lukuja on  $n+m-1$  kappaletta,  $f(n) = n+m = n + \max\{k \mid f(k) < n\}$ . Olkoon  $t$  yhtälön

$$x = 1 + \frac{1}{x}$$

positiivinen juuri. Osoitetaan induktiolla, että  $f(n) = [tn]$  kaikilla  $n \geq 1$ . Koska

$$t = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

niin  $[t] = 1 = f(1)$ . Okoon  $n \geq 2$  ja olkoon  $f(k) = [tk]$ , kun  $k < n$ . Silloin  $f(n) = n + \max\{k \mid [tk] < n\}$ . Koska epäyhtälö  $[tm] < n$  toteutuu silloin ja vain silloin, kun  $tm < n$  eli  $m < \frac{n}{t}$  eli  $m \leq \left[\frac{n}{t}\right]$ , on  $\max\{k \mid [tk] < n\} = \left[\frac{n}{t}\right]$  ja siis

$$f(n) = n + \left[\frac{n}{t}\right] = \left[n + \frac{n}{t}\right] = [tn].$$

Täten  $f(240) = [120(\sqrt{5} + 1)] = 388$ .

**78.4.** Kolmion  $ABC$  tasakylkisyydestä seuraa, että tehtävän kuvio on symmetrinen  $ABC$ :n ympäri piirretyn ympyrän halkaisijan  $AD$  suhteen; että  $D$  on tehtävän kahden ympyrän sivuamispiste; että  $PQ \parallel BC$ ; että  $\angle PDA = \angle QDA$ ; ja että  $PQ$ :n keskipiste  $I$  on  $AD$ :llä. Jos  $\angle ABC = \beta$ , niin  $\angle APQ = \beta$  ja (samaa kaarta kuin tangenttikulma  $APQ$  vastaavana kehäkulmana)  $\angle PDQ = \beta$  ja siis  $\angle PDA = \frac{\beta}{2}$ . Kulmat  $PID$  ja  $PBD$  ovat suoria. Nelikulmion  $PBDI$  ympäri voidaan siten piirtää ympyrä. Kehäkulmalause sovellettuna tähän ympyrään antaa  $\angle PBI = \angle PDI = \frac{\beta}{2}$ . Siis  $I$  on myös kulman  $ABC$  puolittajalla. Kolmion  $ABC$  kulmanpuolittajien leikkauspiste eli kolmion sisään piirretyn ympyrän keskipiste on, kuten väitettiin, piste  $I$ .

**78.5.** Olkoon  $n$  kiinteä; oletetaan, että joillekin luvuille  $j, k$  pätee  $1 \leq j < k \leq n$ , mutta  $a_k < a_j$ . Silloin

$$\frac{a_j}{j^2} + \frac{a_k}{k^2} - \frac{a_j}{k^2} - \frac{a_k}{j^2} = (a_j - a_k) \left( \frac{1}{j^2} - \frac{1}{k^2} \right) > 0.$$

Tehtävän epäyhtälön vasen puoli pienenee, jos  $a_k$  ja  $a_j$  vaihdetaan keskenään. Äärellisen monen vaihdon jälkeen ”kertoimet”  $a_j$  saadaan suuruusjärjestykseen; jos pienintä luvuista  $a_j$  merkitään  $b_1$ :llä, seuraavaa  $b_2$ :lla jne., on siten  $b_k \geq k$

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{k^2} \geq \sum_{k=1}^n \frac{k}{k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

**78.6.** Tehdään vastaoletus: joukko  $\{1, 2, \dots, 1978\}$  voidaan jakaa kuudeksi osajoukoksi  $A_1, A_2, \dots, A_6$ , siten, että jos  $x \in A_k, y \in A_k$ , niin  $x + y \notin A_k$ . Koska  $1978 = 6 \cdot 329 + 4$ , ainakin yhdessä joukoista  $A_k$  on silloin ainakin 330 alkioita. Olkoon  $A_1$  tällainen joukko ja  $a_1 > a_2 > \dots > a_{330}$  joukon  $A_1$  alkioita. 329 positiivista lukua  $a_1 - a_2, a_1 - a_3, \dots,$

$a_1 - a_{330}$  kuuluvat silloin kaikki joukkoihin  $A_2, A_3, A_4, A_5$  tai  $A_6$ . Koska  $329 = 5 \cdot 65 + 4$ , ainakin yhteen joukoista, esim. joukkoon  $A_2$ , kuuluu ainakin 66 näistä luvuista, nimittäin luvut  $b_1 = a_1 - a_{i_1}, b_2 = a_1 - a_{i_2}, \dots, b_{66} = a_1 - a_{i_{66}}$ . Koska  $b_k - b_j = a_{i_k} - a_{i_j}$ ,  $b_j$ -lukujen positiiviset erotukset eivät kuulu kumpaankaan joukoista  $A_1$  ja  $A_2$ . 65:sta luvusta  $b_{66} - b_1, b_{66} - b_2, \dots, b_{66} - b_{65}$  ainakin 17 kuuluu yhteen joukoista  $A_3, A_4, A_5$  tai  $A_6$ ; sanokaamme joukkoon  $A_3$ . Olkoot  $c_1 > c_2 > \dots > c_{17}$  tällaisia lukuja. Lukujen  $c_k$  erotukset voidaan kirjoittaa sekä  $b_j$ - että  $a_i$ - lukujen erotuksiksi, joten positiiviset erotukset  $c_k - c_j$  luuluvat kaikki joukkoihin  $A_4, A_5$  tai  $A_6$ . Kuudestatoista erotuksesta  $c_1 - c_j, 2 \leq j \leq 17$ , voidaan ainakin kuuden, nimittäin lukujen  $d_1 < d_2 < d_3 < d_4 < d_5 < d_6$  olettaa olevan  $A_4$ :ssä. Näiden lukujen erotukset ovat samalla  $c_k$ -,  $b_j$ - ja  $a_i$ -lukujen erotuksia, joten ne ovat kaikki joukoissa  $A_5$  tai  $A_6$ . Siten viidestä erotuksesta  $d_6 - d_l, 1 \leq l \leq 5$ , ainakin kolmen, sanokaamme lukujen  $e_1 < e_2 < e_3$ , voidaan olettaa olevan joukossa  $A_5$ . Kuten edellä, todetaan, positiiviset erotukset  $e_i - e_j$  eivät voi kuulua joukkoihin  $A_1, \dots, A_5$ . Luvut  $f_1 = e_3 - e_1$  ja  $f_2 = e_3 - e_2$  ovat siten joukossa  $A_6$ . Mutta  $f_1 - f_2 > 0$  ei aikaisemman päättelyn mukaan voi kuulua mihinkään joukoista  $A_j, 1 \leq j \leq 6$ . Ristiriita, joka osoittaa vastaoletuksen vääräksi!

**79.1.** Kirjoitetaan summan parillisnimittäjaiset negatiiviset yhteenlaskettavat muotoon

$$-\frac{1}{2k} = \frac{1}{2k} - \frac{1}{k}.$$

Täten saadaan

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} &= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{1319}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{1318}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{1319} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{659} \frac{1}{k} = \sum_{k=660}^{1319} \frac{1}{k} = \sum_{j=0}^{329} \left(\frac{1}{660+j} + \frac{1}{1319-j}\right) \\ &= \sum_{j=0}^{329} \frac{1979}{(660+j)(1319-j)}. \end{aligned}$$

Viimeinen summa on selvästi muotoa

$$1979 \frac{a}{b},$$

missä  $b$  on lukujen  $(660+j)(1319-j)$  tulo. Koska 1979 on alkuluku, tällä tulolla ja 1979:llä ei ole yhteisiä tekijöitä, joten lukua 1979 ei voi supistaa pois osoittajasta.

**79.2.** Osoitetaan ensin, että viisikulmioiden sivut ovat keskenään samanväriset. Vastaoletus:  $A_1A_2$  on punainen ja  $A_2A_3$  vihreä. Janoista  $A_2B_j, j = 1, 2, 3, 4, 5$ , ainakin kolme on samanväristä. Olkoot ne  $A_2B_l, A_2B_k$  ja  $A_2B_m$ ; oletetaan, että nämä janat ovat punaisia. Pisteistä  $B_l, B_k$  ja  $B_m$  ainakin kaksi on viisikulmion vierekkäisiä kärkiä. Olkoot ne  $B_l$  ja  $B_k$ . Koska  $A_2B_l$  ja  $A_kB_k$  ovat punaisia,  $B_lB_k$  on vihreä. Koska  $A_1A_2$  ja  $A_2B_k$  ovat punaisia,  $A_1B_k$  on vihreä. Samoin päätellään, että  $A_1B_l$  on vihreä. Mutta nyt kolmio  $A_1B_lB_k$

on vihreä, vastoin oletusta. Vastaoletus on siis väärä, joten viisikulmioiden sivujen on oltava keskenään samanvärisiä.

On vielä osoitettava, että kummankin viisikulmion väri on sama. Tehdään vastaoletus:  $A$ -viisikulmio on vihreä ja  $B$ -viisikulmio on punainen. Jos nyt janoista  $A_1B_j$  ainakin kolme on punaista, niin ainakin kaksi niistä yhdistää  $A_1$ :n  $B$ -viisikulmion viereisiin kärkiin ja synnyttää punaisen kolmion. Mainituista janoista ainakin kolmen on siis oltava vihreitä. Samoin janoista  $A_2B_j$  ainakin kolmen on oltava vihreitä. Mutta näin saaduista kuudesta vihreästä janasta ainakin kahden toinen päätepiste on

sama  $B$ -viisikulmion kärki, sanokaamme  $B_k$ . Kolmio  $A_1A_2B_k$  on kokonaan vihreä, vastoin oletusta. Toinenkin vastaoletus johti ristiriitaan, joten todistettava väite pitää paikkansa.

**79.3.** Olkoot  $O_1$  ja  $O_2$  ympyröiden keskipisteet,  $B$  niiden toinen leikkauspiste,  $C_1$  ja  $C_2$  pisteen  $A$  kautta kulkevan ja  $AB$ :tä vastaan kohtisuoran suoran ja ympyröiden (toiset) leikkauspisteet ja  $Q_1$  sekä  $Q_2$  liikkuvien pisteiden asemat mielivaltaisella hetkellä. Koska pisteiden kulmanopeudet ovat samat,  $\angle AO_1Q_1 = \angle AO_2Q_2 = \alpha$ . Kehäkulmalauseeseen nojalla  $\angle ABQ_1 = \frac{\alpha}{2}$  ja  $\angle ABQ_2 = \frac{1}{2}(2\pi - \alpha) = \pi - \frac{\alpha}{2}$ . Siten  $B$  on janalla  $Q_1Q_2$ . Koska kulmat  $C_1AB$  ja  $C_2AB$  ovat suorita, ovat myös kulmat  $C_1Q_1B$  ja  $C_2Q_2B$  suorita. Siis  $Q_1C_1$  ja  $Q_2C_2$  ovat yhdensuuntaisia. Mutta tästä seuraa, että janalla  $Q_1Q_2$  keskinormaali puolittaa janan  $C_1C_2$ . Siis  $C_1C_2$ :n keskipiste  $P$  on aina  $Q_1Q_2$ :n keskinormaalilla eli yhtä kaukana  $Q_1$ :stä ja  $Q_2$ :sta!

**79.4.** Piirretään suora  $l$  tason  $\pi$  mielivaltaisen pisteen  $R$  ja pisteen  $P$  kautta. Olkoon  $\angle QPR = x$ . Valitaan suoralla  $l$  piste  $S$  siten, että  $P$  on janalla  $RS$  ja  $PS = PQ$ . Silloin  $\angle PQS = \angle PSQ = \frac{x}{2}$ . Olkoon  $\angle SQR = y$ . Sovelletaan sinilauseetta kolmioon  $QSR$ . Saadaan

$$\frac{|QP| + |PR|}{|QR|} = \frac{|SR|}{|QR|} = \frac{\sin y}{\sin \frac{x}{2}}.$$

Jos  $R$  on suoralla  $l$ , niin edellinen osamäärä on suurin, kun  $y = \frac{1}{2}\pi$ . Jos suoraa  $l$  kierretään, niin osamäärä saa maksimiarvon, kun  $x$  on mahdollisimman pieni. Tämä tapahtuu silloin, kun  $l$  kulkee  $Q$ :n  $\pi$ :llä olevan kohtisuoran projektion  $Q'$  kautta. Jos suora  $PQ'$  on yksikäsitteinen,  $R$ :kin on yksikäsitteinen. Jos taas  $P = Q'$ , kaikki  $P$ -keskisen ja  $QP$ -säteisen ympyrän pisteet kelpaavat pisteeksi  $R$ .

**79.5.** Tehtävän yhtälöistä seuraa

$$\sum_{k=1}^5 a^2 k x_k + \sum_{k=1}^5 k^5 x_k - 2a \sum_{k=1}^5 2ak^3 x_k = 0$$

eli

$$\sum_{k=1}^5 k (a - k^2)^2 x_k = 0.$$

Koska  $x_k$ :t ovat ei-negatiivisia, kaikki yhteenlaskettavat ovat nollia. Tämä onnistuu joko niin, että kaikki  $x_k$ :t ovat nollia, jolloin myös  $a = 0$ , tai niin, että neljä  $x_k$ :ta on  $= 0$  ja viides,  $x_j$ , on  $\neq 0$ , mutta  $a - j^2 = 0$ . Tällöin  $x_j = j$ . Mahdolliset  $a$ :n arvot ovat neliöt 0, 1, 4, 9, 16 ja 25.

**79.6.** Olkoon sammakon 8-kulmio  $ABCDEFGH$ . On selvää, että pariton määrä hyppyjä voi viedä sammakon vain pisteisiin  $B, D, F$  ja  $G$ . Siis  $a_{2n-1} = 0$ . Yhtä selvää on, että  $a_2 = 0$  ja  $a_4 = 2$ . Merkitään  $b_n$ :llä  $C$ :stä alkavien ja  $E$ :hen päättyvien polkujen määrää.  $b_n$  on myös  $G$ :stä alkavien ja  $E$ :hen päättyvien polkujen määrä. Ilmeisesti  $b_2 = 1$ . Kahden hypyn jälkeen  $A$ :sta lähtenyt sammakko on joko  $C$ :ssä,  $G$ :ssä tai  $A$ :ssa; takaisin  $A$ :han sammakko on voinut tulla kahdella tapaa, hypyin  $AB, BA$  tai  $AH, HA$ . Parillisilla  $n$ :n arvoilla pätee siis

$$a_n = 2b_{n-2} + 2a_{n-2}. \quad (1)$$

$C$ :stä lähtenyt sammakko on kahden hypyn jälkeen joko  $E$ :ssä,  $A$ :ssa tai  $C$ :ssä, ja takaisin  $C$ :hen johtivat joko hypyt  $CB, BC$  tai  $CD, DC$ . Jos  $n$  on parillinen ja  $> 2$ , niin

$$b_n = 2b_{n-2} + a_{n-2}. \quad (2)$$

Kun (1) vähennetään (2):sta saadaan

$$b_n - a_n = -a_{n-2},$$

ja kun tässä  $n$  korvataan  $n - 2$ :lla, saadaan arvoilla  $n > 4$  pätevä kaava

$$b_{n-2} = a_{n-2} - a_{n-4}.$$

Kun tämä sijoitetaan yhtälöön (1), tullaan palautuskaavaan

$$a_n = 4a_{n-2} - 2a_{n-4}, \quad (3)$$

joka on voimassa, kun  $n$  on parillinen ja  $> 4$ . Alkuehdot  $a_2 = 0$  ja  $a_4 = 2$  määrittävät (3):n toteuttavan jonon yksikäsitteisesti. On vielä todennettava, että kyseinen jono todella on tehtävässä esitetty. Tehtävän  $x$  ja  $y$  ovat yhtälön

$$t^2 - 4t + 2 = 0$$

juuret. Ne ovat silloin myös yhtälöiden

$$t^{n-1} - 4t^{n-2} + 2t^{n-3} = 0$$

juuria. Mutta tästä seuraa heti, että

$$\frac{x^{n-1} - y^{n-1}}{2} - 4\frac{x^{n-2} - y^{n-2}}{2} + 2\frac{x^{n-3} - y^{n-3}}{2} = 0.$$

Tehtävän jono tottelee palautuskaavaa (3) ja täyttää alkuehdot, joten  $a_n$  on kysytty polkujen lukumäärä.

**81.1.** Olkoot kolmioiden sivujen pituudet  $a$ ,  $b$  ja  $c$  sekä  $x$ ,  $y$  ja  $z$  pisteen  $P$  etäisyydet sivuista  $BC$ ,  $CA$  ja  $AB$ . Jos  $T$  on kolmion ala, niin

$$ax + by + cz = 2T \quad (1),$$

ja tehtävä on minimoida

$$f(x, y, z) = \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}$$

ehdon (1) vallitessa. Käytetään Cauchyn – Schwarzin epäyhtälöä:

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= \left( \sqrt{ax} \sqrt{\frac{a}{x}} + \sqrt{by} \sqrt{\frac{b}{y}} + \sqrt{cz} \sqrt{\frac{c}{z}} \right)^2 \\ &\leq (ax + by + cz) \left( \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right) = 2T \left( \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} \right), \end{aligned}$$

joten

$$\frac{(a + b + c)^2}{2T} \leq \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z}.$$

Cauchyn – Schwarzin epäyhtälön yhtäsuuruusehdon nojalla yhtäsuuruus vallitsee vain, jos

$$\frac{a}{x} = kax, \quad \frac{b}{y} = kby, \quad \frac{c}{z} = kcz,$$

eli jos  $x = y = z$ .  $f(x, y, z)$  saa näin ollen minimiarvon vain, kun  $P$  on kolmion  $ABC$  sisään piirretyn ympyrän keskipiste.

**81.2.** Sellaisia  $r$ -alkioisia joukkoja, joiden pienin alkio on  $k$ , on  $\binom{n-k}{r-1}$  kappaletta. (Joukon  $r-1$   $k$ :ta suurempaa alkioita valitaan lukujen  $n-k+1, \dots, n$  joukosta.) Koska  $r$ -alkioisia joukkoja on kaikkiaan  $\binom{n}{r}$  kappaletta, on

$$\binom{n}{r} F(n, r) = \sum_{k=1}^{n-r+1} k \binom{n-k}{r-1}. \quad (1)$$

Binomikertoimien perusominaisuuden nojalla

$$\binom{n-k}{r-1} = \binom{n-k+1}{r} - \binom{n-k}{r}.$$

Yhtälön (1) oikean puolen summa on täten

$$\sum_{k=1}^{n-r+1} \left( (k-1) \binom{n-k+1}{r} - k \binom{n-k}{r} \right) + \sum_{k=1}^{n-r+1} \binom{n-k+1}{r}.$$

Tässä edellisen summan peräkkäisten yhteenlaskettavien positiiviset ja negatiiviset osat kumoavat toisiaan, ja ensimmäisestä summasta jää vain

$$0 - (n - r + 1) \binom{r - 1}{r} = 0.$$

Kun jälkimmäiseen summaan sijoitetaan

$$\binom{n - k + 1}{r} = \binom{n - k + 2}{r + 1} - \binom{n - k + 1}{r + 1}$$

ja otetaan huomioon samanlainen peräkkäisten termien kumoutuminen, saadaan (1):n oikean puolen summaksi viimein  $\binom{n + 1}{r + 1}$ . Kysytty keskiarvo on siis

$$F(n, r) = \frac{\binom{n + 1}{r + 1}}{\binom{n}{r}} = \frac{n + 1}{r + 1}.$$

**81.3.** Oletetaan, että  $(n, m)$ , toteuttaa tehtävän yhtälön. Jos  $m > 1$ , niin on oltava  $n > m$ . Jos  $m = 1$ , on oltava  $n = 1$  tai  $n = 2$ . Jos  $p = n - m$ , niin

$$1 = (n^2 - nm - m^2)^2 = (m^2 + 2pm + p^2 - pm - m^2 - m^2)^2 = (m^2 - pm - p^2)^2.$$

Siis myös pari  $(m, n - m)$  toteuttaa yhtälön. Jos  $n - m > 1$ , päättely voidaan uudistaa. Näin saadaan jono  $n = n_k, m = n_{k-1}, n_{k-2}, \dots$ , missä  $(n_i, n_{i-1})$  toteuttaa tehtävän yhtälön ja  $n_{i-2} = n_i - n_{i-1}$ . Jono päättyy, kun  $n_i = 1$ . Mutta silloin on oltava  $n_{i+1} = 2$ . Jono on siis Fibonaccin jono 1597, 987,  $\dots$ , 13, 8, 5, 3, 2, 1. Kääntäen voidaan todeta, että Fibonaccin jonon jäsenet toteuttavat tehtävän yhtälön. Kysytty  $m^2 + n^2$ :n maksimoiva pari on  $n = 1597, m = 987$ .

**81.4.** Jos luku  $m$  jakaa tasan lukujen  $(m - 1)$  ja  $(m - 2)$  pienimmän yhteisen monikerran, niin jokainen  $m$ :n alkutekijä  $p$  on  $\leq 2$ . Muuten  $p$  ei olisi tekijänä kummassakaan luvusta  $m - 2$  ja  $m - 1$ . Mutta jos  $m = 2^k$ , niin  $m - 1$  on pariton ja  $m$ :n on oltava tekijänä itseään pienemmässä luvussa  $m - 2$ . Siis tapaus  $n = 3$  on mahdoton. Tarkastellaan tapausta  $n = 4$ . Jos  $m$  on tekijänä lukujen  $m - 3, m - 2$  ja  $m - 1$  pienimmässä yhteisessä monikerrassa, niin  $m$ :n alkutekijät ovat  $< 5$ ; siis  $m = 2^r 3^s$  ja  $m - 3 = 3(2^r 3^{s-1} - 1)$  ja  $m - 2 = 2(2^{r-1} 3^s - 1)$ .  $m$  jakaa näiden lukujen pienimmän yhteisen monikerran vain, jos tulojen jälkimmäiset tekijät ovat ykkösiä, eli kun  $r = s = 1$ . Tällöin on oltava  $m = 6$ . Luku 6 on todella tekijänä lukujen 3, 4 ja 5 pienimmässä yhteisessä monikerrassa 60. Tehtävän (b)-kohdan vastaus on  $n = 4$ .

Jos  $n > 4$ , niin sekä  $m = (n - 1)(n - 2)$  että  $m = (n - 2)(n - 3)$  kelpaavat kysytyksi suurimmaksi luvuksi:  $(n - 1)(n - 2)$  jakaa tasan lukujen  $m - (n - 1) = (n - 1)(n - 3)$  ja  $m - (n - 2) = (n - 2)(n - 2)$  tulon (jonka tekijöillä ei ole yhteisiä tekijöitä ja joka niin ollen on tekijänä kaikkien  $n$ :n luvun pienimmässä yhteisessä monikerrassa), ja  $m = (n - 2)(n - 3)$  jakaa vastaavasti tasan lukujen  $m - (n - 2)$  ja  $m - (n - 3)$  tulon. Kaikilla  $n > 4$  kysytyjä joukkoja on siis useampiakin kuin yksi.

**81.5.** Olkoon tehtävän kolmio  $ABC$  ja olkoot tehtävän ympyröiden keskipisteet  $D$ ,  $E$  ja  $F$ . Koska ympyrät sivuavat kolmion sivuja, kolmion  $DEF$  sivut ovat kolmion  $ABC$  sivujen suuntaiset, joten  $DEF$  on yhdenmuotoinen, vieläpä homoteettinen, kolmion  $ABC$  kanssa. Suorat  $AD$ ,  $BE$  ja  $CF$  kulkevat homotetiakeskuksen kautta; koska ne ovat kolmion  $ABC$  kulmanpuoilittajia, homotetiakeskus on kolmion  $ABC$  (ja kolmion  $DEF$ ) sisään piirretyn ympyrän keskipiste  $I$ . Piste  $O$  on kolmion  $DEF$  ympäri piirretyn ympyrän keskipiste. Homotetiassa  $O$  kuvautuu kolmion  $ABC$  ympäri piirretyn ympyrän keskipisteelle  $O'$ ; siis  $I$ ,  $O$  ja  $O'$  ovat samalla suoralla!

**81.6.** Todetaan ensin, että  $f(1, 0) = f(0, 1) = 2$  ja  $f(1, 1) = f(0, f(1, 0)) = f(0, 2) = 3$ . Edelleen  $f(1, 2) = f(0, f(1, 1)) = f(0, 3) = 4$ . Induktiolla saadaan yleisesti  $f(1, k) = k+2$ :  $f(1, k) = f(0, f(1, k-1)) = f(0, k+1) = k+2$ . Seuraavaksi tarkastellaan tapauksia  $x=2$ :  $f(2, 0) = f(1, 1) = 3$ ,  $f(2, 1) = f(1, f(2, 0)) = f(1, 3) = 5$ , ja induktiolla yleisesti  $f(2, k) = 2k+3$ . Jatketaan samoin  $f(3, k)$ :n määrittämiseksi:  $f(3, 0) = f(2, 1) = 5 = 2^3 - 3$ ,  $f(3, 1) = f(2, f(3, 0)) = f(2, 5) = 10 + 3 = 2^4 - 3$ , ja jos  $f(3, k) = 2^{k+3} - 3$ , niin  $f(3, k+1) = f(2, 2^{k+3} - 3) = 2^{k+1+3} - 6 + 3 = 2^{k+1+3} - 3$ . Siis  $f(3, k) = 2^{k+3} - 3$  kaikilla  $k$ . Nyt  $f(4, 0) = f(3, 1) = 2^4 - 3$  ja  $f(4, 1) = f(3, 2^4 - 3) = 2^{2^4 - 3 + 3} - 3 = 2^{2^{2^2}} - 3$ . Tästä saadaan induktiolla heti

$$f(4, k) = 2^{2^{\dots^2}} - 3,$$

missä ensimmäisessä yhteenlaskettavassa on kaikkiaan  $k+3$  kakkosta ”eksponenttitornina”. Kun  $k = 1981$ , kakkosia on 1984. [Funktio  $f$  on ns. *Ackermannin funktio*.]

**82.1.** Koska  $0 = f(2) \geq f(1) + f(1)$ , on  $f(1) = 0$ . Edelleen  $f(3) = f(2) + f(1) + x = x$ , missä  $x = 0$  tai  $x = 1$ . Koska  $f(3) > 0$ , niin  $f(3) = 1$ . Induktiivisesti nähdään, että  $f(3n) \geq n$  kaikilla  $n$ : jos  $f(3n) \geq n$ , niin  $f(3(n+1)) \geq f(3n) + f(3) \geq n+1$ . Sama päättely osoittaa, että jos  $f(3k) > k$ , niin  $f(3n) > n$  kaikilla  $n \geq k$ . Koska  $f(9999) = 3333$ , pätee  $f(3n) = n$  kaikilla  $n \leq 3333$ . Siis  $f(3 \cdot 1982) = 1982$ . Toisaalta

$$1982 = f(3 \cdot 1982) \geq 3f(1982),$$

joten  $f(1982) < 661$ . Mutta  $f(1982) \geq f(1980) = f(3 \cdot 660) = 660$ . Ainoa mahdollisuus on, että  $f(1982) = 660$ . Tehtävän ehdon toteuttavia funktioita on myös olemassa, eräs on  $f(n) = \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$ .

**82.2.** Todistetaan, että kolmiot  $M_1M_2M_3$  ja  $S_1S_2S_3$  ovat homoteettiset; kysytty yhteinen piste on silloin homotetiakeskus. Olkoot  $A_1B_1$ ,  $A_2B_2$  ja  $A_3B_3$  kolmion  $A_1A_2A_3$  kulmanpuoilittajat ja  $I$  niiden leikkauspiste. Silloin  $\angle T_3IT_1 = 180^\circ - A_2$ ,  $\angle T_3B_3A_3 = A_2 + \frac{1}{2}A_3$ ,  $\angle T_3IS_3 = 2(\angle T_3IB_3) = 180^\circ - 2A_2 - A_3$  ja  $\angle S_3IT_1 = \angle T_3IT_1 - \angle T_3IS_3 = A_2 + A_3$ . Aivan samoin lasketaan  $\angle S_2IT_1 = A_3 + A_2$ . Mutta tämä merkitsee, että  $S_2S_3 \parallel A_2A_3$ . Samoin todetaan, että kolmion  $S_1S_2S_3$  kaksi muuta sivua ovat  $A_1A_2A_3$ :n sivujen ja siis myös  $M_1M_2M_3$ :n sivujen suuntaiset. Kolmiot  $S_1S_2S_3$  ja  $M_1M_2M_3$  ovat homoteettisia. Ne eivät ole samat, koska kolmion  $M_1M_2M_3$  ympäri piirretty ympyrä ei ole sama kuin kolmion  $A_1A_2A_3$  sisään piirretty ympyrä (koska  $A_1A_2A_3$  ei ole tasakylkinen). Todistus on valmis.

**82.3.** a) Osoitetaan, että tehtävän jonoille  $(x_n)$  pätee aina kun sarja suppenee

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_{k-1}^2}{x_k} \geq 4.$$

(Jos sarja hajaantuu, sen jokin osasumma on varmasti  $> 4$ ). Olkoon  $a$  kaikkien suppenneiden sarjojen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_{k-1}^2}{x_k}, \quad (x_0 = 1, \quad x_i \geq x_{i+1}) \quad (1)$$

summien suurin alaraja eli infimum. Silloin jokaisella positiivisella luvulla  $\varepsilon$  on olemassa jokin sarja (1), jonka summa on  $< a + \varepsilon$ . Merkitään tällaisessa sarjassa  $y_i = \frac{x_{i+1}}{x_1}$ . Sarjan summa on tällöin

$$\frac{1}{x_1} + x_1 \left( \frac{y_0^2}{y_1} + \frac{y_1^2}{y_2} + \dots \right) \geq \frac{1}{x_1} + x_1 a \geq 2\sqrt{a}.$$

(Jälkimmäinen epäyhtälö perustuu siihen, että

$$\left( \frac{1}{\sqrt{x_1}} - \sqrt{x_1 a} \right)^2 \geq 0.)$$

Siis  $a + \varepsilon \geq 2\sqrt{a}$  kaikilla  $\varepsilon > 0$ . Tämä on mahdollista vain, jos  $a \geq 2\sqrt{a}$  eli  $a \geq 4$ .

b) Kun  $x_i = 2^{-i}$ , niin tehtävän sarja (1) on geometrinen sarja

$$2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots,$$

jonka peräkkäisten termien suhde on  $\frac{1}{2}$ ; tällaisen sarjan summa on tasan 4, joten sen kaikki osasummat ovat  $< 4$ .

**82.4.** Koska

$$x^3 - 3xy^2 + y^3 = (y - x)^3 - 3x^2y + 2x^3 = (y - x)^3 - 3(y - x)x^2 + (-x)^3,$$

nähdään, että jos pari  $(x, y)$  toteuttaa yhtälön, niin myös pari  $(y - x, -x)$  toteuttaa sen. Toistamalla sama päättely nähdään, että myös pari  $(-x - (y - x), -y + x) = (-y, x - y)$  toteuttaa yhtälön. Jos jotkin kaksi paria olisivat samat, olisi  $x = y = 0$ , jolloin  $x^3 - 3xy^2 + y^3 = 0 \neq n$ .

Olkoon sitten  $n = 2891$ . Silloin olisi

$$x^3 + y^3 \equiv -1 \pmod{3}.$$

Tämä toteutuu vain, kun joko  $x \equiv -1$  ja  $y \equiv 0 \pmod{3}$ ,  $x \equiv 0$  ja  $y \equiv -1 \pmod{3}$  tai  $x \equiv 1$  ja  $y \equiv 1 \pmod{3}$ . Ensimmäisessä tapauksessa  $x \equiv 2, 5$  tai  $8 \pmod{9}$  ja  $3xy^2 \equiv y^3 \equiv 0 \pmod{9}$ . Koska  $2^3, 5^3$  ja  $8^3$  ovat  $\equiv \pm 1 \pmod{9}$  ja  $2891 \equiv 2 \pmod{9}$ , ratkaisua ei ole. Sama päättely osoittaa, että ratkaisua ei ole myöskään toisessa tapauksessa. Kolmaskaan tapaus ei ole mahdollinen, sillä jos ratkaisu  $(x, y)$  olisi  $(1, 1) \pmod{3}$ , olisi  $(y - x, -x) \equiv (0, -1) \pmod{3}$ , eli oltaisiin jo torjutussa tilanteessa. Yhtälöllä ei ole ratkaisua.



**82.5.** Oletuksista seuraa, että  $EN = CM$ , joten kolmiot  $BMC$  ja  $DNE$  ovat yhteneviä (sks) ja  $\angle MBC = \angle EDN$ . Jos  $B$ ,  $M$  ja  $N$  ovat samalla suoralla, niin  $\angle NBC = \angle EDN$ . Kuusikulmion säännöllisyydestä seuraa, että  $\angle BCN = 90^\circ$  ja  $\angle CED = 30^\circ$ . Siten

$$\angle BND = \angle BNC + \angle CND = (90^\circ - \angle NBC) + (\angle CED + \angle NDE) = 120^\circ.$$

Jana  $BD$  näkyy pisteestä  $N$  samassa  $120^\circ$ :n kulmassa kuin kuusikulmion keskipisteestä  $O$ . Siis  $CN = CD = CO$ . Toisaalta on helppo laskea, että  $CE = \sqrt{3}CO$ . Siis

$$\lambda = \frac{CN}{CE} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

**82.6.** Kun kuljetaan murtoviivaa  $A_1$ :stä alkaen, tullaan ensimmäiseen pisteeseen  $B_1$ , joka on etäisyydellä  $\leq \frac{1}{2}$  jostakin neliön kärjestä. Olkoon kyseinen kärki  $C_1$ . Jatkettaessa murtoviivaa eteenpäin, tullaan ensimmäiseen pisteeseen  $B_2$ , joka on etäisyydellä  $\leq \frac{1}{2}$  jommasta kummasta  $C_1$ :n viereisestä neliön kärjestä  $C_2$ . Edelleen jatkamalla tullaan jossain vaiheessa ensimmäiseen murtoviivan pisteeseen, joka on enintään etäisyydellä  $\frac{1}{2}$  toisesta  $C_1$ :n viereisestä kärjestä  $C_4$ . Piste  $B_2$  jakaa murtoviivan kahteen osaan; olkoon  $L_1$  se osa, johon  $A_1$  kuuluu. Olkoon  $S_1$  niiden sivun  $C_1C_4$  pisteiden joukko, joiden etäisyys jostakin  $L_1$ :n pisteestä on  $\leq \frac{1}{2}$  ja  $S_2$  niiden sivun  $C_1C_4$  pisteiden joukko, joiden etäisyys jostakin  $L_2$ :n pisteestä on  $\leq \frac{1}{2}$ . Koska  $C_1 \in S_1$  ja  $C_4 \in S_2$ , kumpikaan joukko ei ole tyhjä, ja joukkojen yhdiste on koko sivu  $C_1C_2$ . Tällöin joukoilla  $S_1$  ja  $S_2$  on yhteinen piste; olkoon se  $D$ . Olkoot  $P$  ja  $Q$  sellaiset  $L_1$ :n ja  $L_2$ :n pisteet, joille  $|PD| \leq \frac{1}{2}$  ja  $QD \leq \frac{1}{2}$ . Silloin  $|PQ| \leq 1$  ja  $P$ :n ja  $Q$ :n välisen murtoviivan pituus on ainakin  $|PB_2| + |B_2Q| < 99 + 99 = 198$ . (Yhteisen pisteen  $D$  olemassaolon tarkka todistus perustuu reaali lukujen joukon täydellisyysominaisuuteen. Asia voidaan kiertää käyttämällä kahta lähellä toisiaan olevaa  $S_1$ :n ja  $S_2$ :n pistettä ja sitä, että ”tarkka” yläraja 198 saavutettaisiin vain silloin, kun  $P$ ,  $Q$  ja  $B_2$  olisivat kaikki neliön sivulla  $C_1C_2$ , joka kuitenkin oletuksen mukaan ei ole mahdollista.)

**83.1.** Olkoon  $x$  mielivaltainen ja  $a = xf(x)$ . Silloin  $a \neq 0$  ja  $f(a) = f(xf(x)) = xf(x) = a$ . Osoitetaan induktiolla, että  $f(a^n) = a^n$ , kun  $n$  on positiivinen kokonaisluku. Näin on, kun  $n = 1$ . Oletetaan, että  $f(a^k) = a^k$ . Silloin  $f(a^{k+1}) = f(af(a^k)) = a^k f(a) = a^{k+1}$ . Jos olisi  $a > 1$ , olisi  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^n = \infty$ . Siis  $a \leq 1$ . Toisaalta  $f(1) = f(a^{-n}a^n) = f(a^{-n}f(a^n)) = a^n f(a^{-n})$ , joten  $f(a^{-n}) = f(1)a^{-n}$ . Jos olisi  $a < 1$ , olisi  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a^{-n}) = \infty$ . Siis  $a = 1$ . Koska  $x$  on mielivaltainen, on oltava  $f(x) = \frac{1}{x}$  kaikilla  $x > 0$ . – Helposti nähdään, että funktio  $f$ ,  $f(x) = \frac{1}{x}$  todella myös toteuttaa tehtävän ehdot.

**83.2.** Oletetaan, että  $C_1$  on ympyröistä säteeltään pienempi. Olkoon ympyröiden yhteisten tangenttien leikkauspiste  $S$  ja leikatkaa suora  $SA$  ympyrän  $C_1$  myös pisteessä  $B$ .

Väitteen todistamiseksi riittää, kun osoitetaan, että kulmat  $O_2AM_2$  ja  $O_1AM_1$  ovat yhtä suuret. Koska kulmat  $O_1BM_1$  ja  $O_2AM_2$  ovat vastinkulmia  $S$ -keskisessä homotetiassa ja siis yhtä suuret, riittää, että osoitetaan pisteiden  $A$ ,  $B$ ,  $O_1$  ja  $M_1$  olevan samalla ympyrällä. Tällöin kulmat  $O_1AM_1$  ja  $O_1BM_1$  tulevat olemaan samaa jännetä  $O_1M_1$  vastaavia kehäkulmia ja siis yhtä suuria. Merkitään kulman  $M_1SP_1$  suuruutta  $x$ :llä. Silloin tunnetun pisteen potenssia koskevan lauseen nojalla on

$$SA \cdot SB = SP_1^2 = SO_1 \cdot \cos x \cdot \frac{SM_1}{\cos x} = SO_1 \cdot SM_1.$$

Samaa lausetta käänteiseen suuntaan soveltamalla nähdään, että  $B$  on pisteiden  $O_1$ ,  $M_1$  ja  $A$  kautta kulkevalla ympyrällä, ja todistus on valmis.

**83.3.** Lukujen  $ab$ ,  $bc$  ja  $ca$  suurin yhteinen tekijä on 1. Siksi jokaisella kokonaisluvulla  $n$  on esitys

$$n = x_0bc + y_0ca + z_0ab.$$

Jos  $x = x_0 + as$ ,  $y = y_0 + bt$  ja  $z = z_0 - cs - ct$ , niin  $n = xbc + yca + zab$ . Valitaan  $s$  ja  $t$  niin, että  $0 \leq x < a$  ja  $0 \leq y < b$ . Jos  $n > 2abc - ab - bc - ca$ , niin

$$zab = n - xbc - yca > 2abc - ab - bc - ca - (a-1)bc - (b-1)ac = -ab,$$

joten  $z \geq 0$ . Tässä tapauksessa luvulla  $n$  on vaadttu esitys. Mutta jos olisi  $2abc - ab - bc - ca = xbc + yca + zab$ , olisi  $x + 1$  jaollinen  $a$ :lla,  $y + 1$  jaollinen  $b$ :llä ja  $z + 1$  jaollinen  $c$ :llä. Tästä seuraisi  $a \leq x + 1$ ,  $b \leq y + 1$  ja  $c \leq z + 1$ , ja ristiriita  $2abc > 3abc$ .

**83.4.** Oletamme, että  $E$  olisi ositettu joukoiksi  $S$  ja  $T$ , joista kumpikaan ei sisällä suorakulmaisen kolmion kärkiä. Valitaan sivuilta  $AB$ ,  $BC$  ja  $CA$  pisteet  $C'$ ,  $A'$  ja  $B'$ , joista kukin jakaa sivunsa suhteessa 2 : 1. Helposti havaitaan, että  $A'B'C'$  on tasasivuinen kolmio jonka sivut ovat kohtisuorassa kolmion  $ABC$  sivuja vastaan. Voimme olettaa, että pisteet  $A'$  ja  $B'$  kuuluvat samaan osituksen joukkoon, esimerkiksi  $S$ :ään. Silloin kaikki janan  $BC$  pisteet  $A'$ :a lukuun ottamatta kuuluvat  $T$ :hen. Mutta nyt kaikkien  $BA$ :n ja  $AC$ :n pisteiden on kuuluttava  $S$ :ään, joten löytyy äärettömän monta suorakulmaista kolmiota, joiden kaikki kärjet kuuluvat  $S$ :ään!

**83.5.** Olkoon  $k_n$  kokonaisluku ja  $B_n \subset \{1, \dots, k_n\}$  joukko, joka ei sisällä kolmea peräkkäistä aritmeettisen jonon jäsentä. Konstruoidaan uusi joukko  $B_{n+1}$  seuraavasti:  $B_{n+1} = B_n \cup \{3k_n - x \mid x \in B_n\}$ . Asetetaan vielä  $k_{n+1} = 3k_n - 1$ . Nyt  $B_n \subset \{1, \dots, k_{n+1}\}$  ja jos  $\{a - x, a, a + x\} \subset B_{n+1}$  joillakin  $a$  ja  $x \geq 1$ , niin mahdollisuudet  $a + x \leq k_n$  ja  $a - x \geq 2k_n$  ovat poissuljetut  $B_n$ :n ominaisuuksien takia. Siis on oltava  $x \geq k_n$ , jolloin joko  $a - x < 1$  ja  $a - x \notin B_{n+1}$  tai  $a + x \geq 3k_n$ , jolloin  $a + x \notin B_{n+1}$ . Siis  $B_{n+1}$  ei sisällä kolmea aritmeettisen jonon jäsentä. Olkoon nyt  $k_1 = 2$  ja  $B_1 = \{1, 2\}$ . Konstruoidaan joukot  $B_2, B_3, \dots, B_{11}$  kuvatulla tavalla. Joukossa  $B_{11}$  on  $2^{11} = 2048 > 1983$  alkiota, jotka kaikki ovat pienempiä kuin  $k_{11}$ ; toisaalta  $k_{11} < 3^9 \cdot k_2 = 5 \cdot 3^9 = 98415 < 10^5$ .

**83.6.** Merkitään kolmion kärkien etäisyyksiä kolmion sisään piirretyn ympyrän ja kolmion sivujen yhteisistä pisteistä  $x$ :llä,  $y$ :llä ja  $z$ :lla. Silloin

$$a = x + y, \quad b = y + z, \quad c = z + x.$$

Todistettava epäyhtälö on nyt yhtäpitävä epäyhtälöiden

$$xy^3 + yz^3 + zx^3 \geq xyz(x + y + z)$$

ja

$$\begin{aligned} & \left( (y\sqrt{xy})^2 + (z\sqrt{zy})^2 + (x\sqrt{xz})^2 \right) \left( (\sqrt{z})^2 + (\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2 \right) \\ & \geq (\sqrt{xyz}(z + x + y))^2. \end{aligned}$$

Kysymyksessä on (valepukuinen) Cauchyn – Schwarzin epäyhtälö

$$\sum a_i^2 \sum b_i^2 \geq \left( \sum a_i b_i \right)^2.$$

Cauchyn – Schwarzin epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus, jos  $a_i = cb_i$  kaikilla  $i$ ; tehtävän tilanteessa yhtäsuuruuden ehto on

$$\frac{\sqrt{xy}y}{\sqrt{z}} = \frac{\sqrt{yz}x}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{zx}y}{\sqrt{y}};$$

tästä seuraa helposti  $x = y = z$  eli  $a = b = c$ . Epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus aina ja vain, kun kolmio on tasasivuinen.

**84.1.** Koska  $x \leq 1$  ja  $z \leq 1$ , niin

$$yz + zx + xy - 2xyz = yz(1 - x) + xy(1 - z) + zx \geq 0.$$

Luvuista  $x$ ,  $y$  ja  $z$  ainakin kaksi on  $\leq \frac{1}{2}$ . Tarkastellaan lukuja  $a = 1 - 2x$ ,  $b = 1 - 2y$  ja  $c = 1 - 2z$ . Näille pätee  $a + b + c = 3 - 2(x + y + z) = 1$  ja

$$xy + yz + zx - 2xyz = \frac{1 + abc}{4}.$$

Luvuista  $x$ ,  $y$  ja  $z$  enintään yksi on  $> \frac{1}{2}$ . Jos tällainen luku on olemassa, tasan yksi luvuista  $a$ ,  $b$  ja  $c$  on negatiivinen, ja  $\frac{1}{4}(1 + abc) < \frac{1}{4} < \frac{7}{27}$ . Jos kaikki luvut  $x$ ,  $y$ ,  $z$  ovat  $\leq \frac{1}{2}$ , niin sovelletaan aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon välistä perusepäyhtälöä, jonka mukaan

$$abc \leq \left( \frac{a + b + c}{3} \right)^3 = \frac{1}{27}.$$

Siis

$$xy + yz + zx - 2xyz \leq \frac{1}{4} \left( 1 + \frac{1}{27} \right) = \frac{7}{27}.$$

**84.2.** Koska

$$\begin{aligned} (a + b)^7 - a^7 - b^7 &= 7ab [(a^5 + b^5) + 3ab(a^3 + b^3) + 5a^2b^2(a + b)] \\ &= 7ab(a + b)(a^2 + ab + b^2)^2, \end{aligned}$$

riittää, kun valitaan  $a$  ja  $b$  niin, että  $a^2 + ab + b^2$  on jaollinen luvulla  $7^3 = 343$ . Tämä edellyttää, että  $(a + b)^2 > a^2 + ab + b^2 \geq 343$  eli  $a + b \geq 19$ . Kokeillaan arvoa  $a = 1$ : onnellisen sattuman kautta  $b = 18$  toteuttaa yhtälön  $b^2 + b + 1 = 343$ . Ratkaisuksi kelpaa siis  $a = 1$ ,  $b = 18$ .

**84.3.** Olkoot  $R$  ja  $S$   $O$ -keskiset  $r$ - ja  $s$ -säteiset ympyrät,  $0 < r < s < 1$ . Jos  $X$  on se  $R$ :n piste, jolla  $a(X) = r(s - r)$ , niin  $C(X)$ :n säde on

$$r + \frac{r(s - r)}{r} = s,$$

joten  $C(X) = S$ . Jos pisteen  $X$  väri ei esiinny ympyrällä  $S$ , niin  $R$ :n ja  $S$ :n pisteiden värien joukot eivät ole samat. Jos värejä kuitenkin on vain äärellinen määrä, niin värien joukkojenkin määrä on äärellinen. Tällöin ei voi löytyä äärettömän monta ympyräparia, joiden värien joukot olisivat eri joukot. Jollakin parilla  $R, S$  on siten välttämättä voimassa tilanne, jossa  $X \in R$  ja  $X$ :n väri esiintyy ympyrällä  $S = C(X)$ .

**84.4.** Jos  $AB \parallel CD$ , niin  $CD$ -halkaisijainen ympyrä sivuaa suoraa  $AB$  jos ja vain jos  $CD$  on kaksi kertaa suorien välinen etäisyys, jonka on oltava puolet  $AB$ :stä. Siis  $|AB| = |CD|$ , joten  $ABCD$  on suunnikas ja  $BC \parallel AD$ . Oletetaan sitten, että  $AB$  ja  $CD$  eivät ole yhdensuuntaisia. Oletetaan myös, että  $CD$ -halkaisijainen ympyrä sivuaa suoraa  $AB$ . Olkoon suorien  $AB$  ja  $CD$  leikkauspiste  $O$  ja olkoon  $\angle AOD = \alpha$ . Silloin

$$\sin \alpha = \frac{\frac{1}{2}DC}{OD + \frac{1}{2}DC} = \frac{\frac{1}{2}AB}{OA + \frac{1}{2}AB},$$

josta seuraa

$$\frac{OD}{DC} = \frac{OA}{AB},$$

ja siten  $AD \parallel BC$ . Sama yhtälöketju voidaan lukea lopusta alkuun; relaatio  $AD \parallel BC$  on yhtäpitävä tehtävän sivuamisominaisuuksien kanssa.

**84.5.** Olkoon tutkittava  $n$ -kulmio  $A_1 A_2 \dots A_n$ . Kirjoitetaan alaindeksit modulo  $n$ . Monikulmiossa on  $\frac{1}{2}n(n - 3)$  lävistäjää. Kolmioepäyhtälö antaa lävistäjien  $A_i A_j$  ja  $A_{i+1} A_{j+1}$  sekä sivujen  $A_i A_{i+1}$  ja  $A_j A_{j+1}$  muodostamista kolmioista suoraan

$$A_i A_j + A_{i+1} A_{j+1} > A_i A_{i+1} + A_j A_{j+1}.$$

Kirjoitetaan tämä epäyhtälö jokaiselle lävistäjälle  $A_{ij}$  ja lasketaan epäyhtälöt puolittain yhteen. Syntyvän epäyhtälön vasemmalla puolella esiintyy jokainen lävistäjä kahdesti, ja oikealla puolella esiintyy jokainen sivu  $n - 3$  kertaa. Siis

$$2d > (n - 3)p,$$

eli tehtävän epäyhtälöistä vasemmanpuolinen on todistettu.

Jokaiselle lävistäjälle  $A_i A_j$  ovat voimassa epäyhtälöt

$$\begin{aligned} A_i A_j &< A_i A_{i+1} + \dots + A_{j-1} A_j \\ A_i A_j &< A_j A_{j+1} + \dots + A_{i-1} A_i. \end{aligned} \tag{1}$$

Jos  $n$  on pariton,  $n = 2k + 1$ , niin kutakin lävistäjää  $A_i A_j$  kohden jommassa kummassa epäyhtälöistä (1) on vähemmän yhteenlaskettavia. Lasketaan kaikkia lävistäjiä kohden nämä epäyhtälöt yhteen. Vasemmaksi puoleksi saadaan lävistäjien summa  $d$ . Oikean puolen laskemiseksi tarkastellaan esim. sivua  $A_n A_1$ . Se esiintyy summassa, jossa on vähemmän (siis enintään  $k$ ) yhteenlaskettavaa lävistäjiä  $A_n A_2, A_n A_3, \dots, A_n A_k$  vastaavissa  $k - 1$ :ssä epäyhtälössä, lävistäjiä  $A_{n-1} A_1, A_{n-1} A_2, \dots, A_{n-1} A_{k-1}$  vastaavissa  $k - 1$ :ssä epäyhtälössä  $A_{n-2} A_1, A_{n-2} A_2, \dots, A_{n-2} A_{k-2}$  vastaavissa  $k - 2$ :ssa epäyhtälössä,  $\dots$ , ja lävistäjää  $A_{k+1} A_1$  vastaavassa yhdessä epäyhtälössä. Sellaisten epäyhtälöiden lukumäärä, joissa sivu  $A_n A_1$  esiintyy, on siis kaikkiaan

$$1 + 2 + \dots + k - 1 + k - 1 = \frac{1}{2}k(k - 1) + k - 1 = \frac{(k - 1)(k + 2)}{2};$$

sama lukumäärä koskee muitakin sivuja, joten epäyhtälöiden oikeiden puolien summa on

$$\frac{p}{2}(k - 1)(k + 2) = \frac{p}{2}(k(k + 1) - 2) = \frac{p}{2} \left( \left[ \frac{n}{2} \right] \left[ \frac{n + 1}{2} \right] - 2 \right).$$

Jos sitten  $n$  on parillinen,  $n = 2k$ , menetellään muuten samoin kuin parittoman  $n$ :n tapauksessa, mutta lävistäjiä  $A_i A_{i+k}$  arvioidaan ylöspäin luvulla  $\frac{p}{2}$ . Saadaan

$$d < \frac{kp}{2} + \frac{p}{2}(k - 2)(k + 1) = \frac{p}{2}(k^2 - 2) = \frac{p}{2} \left( \left[ \frac{n}{2} \right] \left[ \frac{n + 1}{2} \right] - 2 \right).$$

**84.6.** Oletuksen perusteella  $(d - a)^2 > (c - b)^2$ . Kun tähän epäyhtälöön lisätään puolittain  $4ad = 4bc$ , saadaan  $(d + a)^2 > (c + b)^2$  eli  $a + d > b + c$ . Siis  $k > m$ . Yhtälöstä  $a(2^k - a) = b(2^m - b)$  seuraa nyt, että  $2^m$  on tekijänä luvussa  $b^2 - a^2 = (a + b)(b - a)$ . Koska  $(a + b) + (b - a) = 2b$  ei ole jaollinen 4:llä, niin jompi kumpi luvuista  $a + b$  ja  $b - a$  on jaollinen  $2^{m-1}$ :llä. Olkoon se  $x$ . Silloin  $0 < x \leq b + a < b + c = 2^m$ , joten on oltava  $x = 2^{m-1}$ . Nyt  $b + c - x = 2^m - 2^{m-1} = 2^{m-1}$  on joko  $c + a$  tai  $c - a$ . Koska  $a, b$  ja  $c$  ovat parittomia,  $a$ :lla ja  $b$ :llä ei ole yhteisiä tekijöitä, eikä myöskään  $a$ :lla ja  $c$ :llä ole yhteisiä tekijöitä. Koska  $a$  on tekijänä tulossa  $bc$ , on oltava  $a = 1$ .

**85.1.** Olkoon sivulla  $AB$  oleva piste  $O$  toisen tehtävässä mainitun ympyrän keskipiste. Merkitään tämän ympyrän ja sivujen  $AD, DC$  ja  $CB$  sivuamispisteitä  $E, F$  ja  $G$ . Olkoon  $\angle OCF = \alpha$ . Silloin  $\angle DCB = 2\alpha$  ja koska  $ABCD$  on jännenelikulmio,  $\angle DAO = 180^\circ - 2\alpha$ . Kierretään kolmiota  $OCF$  kärjen  $O$ :n ympäri asentoon  $OHE$  ( $H$  on suoralla  $AD$ ). Silloin  $\angle AHO = \alpha$  ja  $\angle HOA = 180^\circ - \alpha - (180^\circ - 2\alpha) = \alpha$ . Kolmio  $AOH$  on siis tasakylkinen:  $AO = AH$ . Mutta  $AH = AE + EH = AE + FC = AE + CG$ , joten

$$AO = AE + CG. \tag{1}$$

Aivan samoin saadaan

$$BO = BG + ED. \tag{2}$$

Väite seuraa, kun yhtälöt (1) ja (2) lasketaan puolittain yhteen.

**85.2.** Tarkastellaan lukujen  $k, 2k, \dots, (n-1)k$  jakojäännöksiä  $r_1, r_2, \dots, r_{n-1}$  modulo  $n$ . Koska  $k$ :lla ja  $n$ :llä ei ole yhteisiä tekijöitä, jakojäännökset ovat  $\neq 0$ . Jos  $pk$ :lla ja  $qk$ :lla olisi sama jakojäännös,  $(p-q)k$  olisi jaollinen  $n$ :llä. Luvut  $r_j$  ovat siis kaikki eri lukuja, joten  $\{r_1, r_2, \dots, r_{n-1}\} = M$ . Mutta  $r_{j+1} = r_j + k$  tai  $r_{j+1} = r_j + k - n$ . Edellisessä tapauksessa  $r_{j+1}$  on samanvärinen kuin  $r_j$  tehtävän ehdon (2) perusteella, jälkimmäisessä tapauksessa  $r_{j+1}$  on samanvärinen kuin  $|k - r_{j+1}| = n - r_j$ , joka puolestaan on samanvärinen kuin  $r_j$ . Tästä nähdään heti, että jokainen  $M$ :n alkio on samanvärinen kuin  $r_1 = k$ .

**85.3.** Jos polynomien  $P$  aste on  $< k$ , niin  $w(P + x^k Q) = w(P) + w(Q)$ . Koska polynomien yhteenlaskussa kaksi paritonkertomista termiä tuottaa parilliskertomisen termin, funktio  $w$  tottelee kolmioepäyhtälöä:  $w(P + Q) \leq w(P) + w(Q)$ . Induktiolla nähdään, että jos  $k = 2^n$ , niin  $w(Q_k) = 2$  ja  $Q_k$ :n ainoat paritonkertomiset termit ovat  $1$  ja  $x^k$ . Nimittäin  $Q_2(x) = 1 + 2x + x^2$  ja jos  $Q_k(x) = 1 + 2 \sum_{i=1}^{k-1} a_i x^i + x^k$ , niin  $Q_k(x)^2 = 1 + 4 \left( \sum_{i=1}^{k-1} a_i x^i \right)^2 + x^{2k} + 4 \sum_{i=1}^{k-1} a_i x^i + 2x^k + 4x^k \sum_{i=1}^{k-1} a_k x^k = 1 + 2 \sum_{i=1}^{2k-1} b_i x^i + x^{2k}$ . Samoin, jos  $k = 2^n$ , niin  $w(Q_k P) = w(P) + w(x^k P)$ .

Todistetaan tehtävän väite induktiolla  $i_n$ :n suhteen. Jos  $i_n = 0$  tai  $i_n = 1$ , asia on selvä. Oletetaan, että  $i_n > 1$ . Valitaan  $k = 2^m$  siten, että  $k \leq i_n < 2^{m+1}$ . Nyt joko  $i_1 < k$  tai  $i_1 \geq k$ . Oletetaan ensin, että  $i_1 < k$ . Silloin  $k$  on lukujen  $i_j$  ja  $i_{j+1}$  välissä:  $i_j < k \leq i_{j+1}$ . Merkitään  $R = \sum_{r=1}^j Q_{i_r}$  ja  $S = \sum_{r=j+1}^n Q_{i_r}$ ,  $Q = R + S$ . Silloin  $Q = R + Q_k S_1$ , missä polynomien  $S_1$  aste on  $< k$  ja  $w(Q) = w(R + S_1 + x^k S_1) = w(R + S_1) + w(S_1)$ . Nyt  $w(R) = w(R + S_1 - S_1) \leq w(R + S_1) + w(-S_1) = w(R + S_1) + w(S_1)$ . Siis  $w(Q) \geq w(R)$ ; induktiooletuksen perusteella toisaalta  $w(R) \geq w(Q_{i_1})$ . Jos sitten  $i_1 \geq k$ , niin voidaan kirjoittaa  $Q_{i_1} = Q_k R$ ,  $Q = Q_k S$ , missä  $R$ :n ja  $S$ :n asteet ovat  $\leq k$ . Nyt  $w(Q) = w(S + x^k S) = 2w(S)$ . Induktiooletuksen nojalla  $w(S) \geq w(R)$ , joten  $w(Q) \geq 2w(R) = w(R + x^k R) = w(Q_{i_1})$ .

**85.4.** Lukua 26 pienempiä alkulukuja on yhdeksän kappaletta. Joukon  $M$  luvut ovat muotoa  $a = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_9^{k_9}$ . Liitetään jokaiseen  $M$ :n alkioon  $a$  jono  $x(a) = (x_1, x_2, \dots, x_9)$ , missä  $x_i = 0$ , jos  $k_i$  on parillinen ja  $x_i = 1$ , jos  $k_i$  on pariton. Jonoja  $x(a)$  on enintään  $2^9 = 512$  kappaletta. Laatikopperiaatteen nojalla  $M$ :ssä on välttämättä pari  $a_1, b_1$ , joille  $x(a_1) = x(b_1)$ . Tällöin  $a_1 b_1 = c_1^2$ , missä  $c_1$  on kokonaisluku. Tällainen pari, jonka tulo on neliö, voidaan poistaa  $M$ :stä ainakin 513 kertaa (itse asiassa useamminkin). Näiden 513 neliön ja niiden neliöjuurten alkutekijät ovat edelleen joukossa  $\{p_1, p_2, \dots, p_9\}$ . Ainakin kahdella neliöjuurella  $c_i$  ja  $c_j$  on  $x(c_i) = x(c_j)$ . Tällöin  $c_i c_j = d^2$  jollekin kokonaisluvulle  $d$ . Mutta  $a_i b_i a_j b_j = c_i^2 c_j^2 = d^4$ .

**85.5.** Leikatkoon suora  $KN$  suorana  $AC$  pisteessä  $P$ ; koska kolmioiden  $ABC$  ja  $KBM$  ympäri piirretyt ympyrät leikkaavat kahdessa eri pisteessä,  $AC$  ja  $KN$  eivät ole yhdensuuntaisia. Leikatkoon  $BP$  kolmion  $KBN$  ympäri piirretyyn ympyrään pisteessä  $M'$ . Jännelikulmioista  $NM'BK$  ja  $NKAC$  nähdään, että  $\angle PM'N = \angle BKN = \angle ACN$ . Tästä seuraa, että myös  $CPM'N$  on jännelikulmio. Mutta siitä, että  $NM'BK$  on jännelikulmio ja kulmat  $NM'C$  ja  $CPN$  ovat samaa  $CPM'N$ :n ympäri piirretyyn ympyrään kaarta vastaavia kehäkulmia, seuraa, että  $\angle BM'C = \angle BM'N + \angle NM'C = \angle AKN + \angle CPN = 180^\circ - \angle BAC$ . Tämä merkitsee, että  $M'$  on kolmion  $ABC$  ympäri piirretyllä ympyrällä eli  $M' = M$ . Olkoon  $O$ -keskisen ympyrän säde  $r$ . Lasketaan pisteiden  $B$  ja  $P$  potenssit toisaalta nelikulmion  $CPMN$  ja kolmion  $ABC$  ympäri piirretyjen ympyröiden ja toisaalta

$O$ -keskisen ympyrän suhteen. Saadaan

$$\begin{aligned} BM \cdot BP &= BN \cdot BC = BO^2 - r^2, \\ PM \cdot PB &= PN \cdot PK = PO^2 - r^2. \end{aligned}$$

Kun nämä yhtälöt vähennetään puolittain toisistaan, saadaan  $PO^2 - BO^2 = BP(PM - BM) = PM^2 - BM^2$ . Viimeinen yhtälö on mahdollinen vain, kun  $OM$  on kohtisuorassa  $BP$ :tä vastaan.

**85.6.** Määritellään funktiojono  $(f_n)$  asettamalla  $f_1(x) = x$  ja

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) \left( f_n(x) + \frac{1}{n} \right), \quad n = 2, 3, \dots$$

Silloin  $x_n = f_n(x_1)$ ,  $x_{n+1} > x_n$  jos ja vain jos  $f_n(x_1) > 1 - \frac{1}{n}$ . Tehtävänä on osoittaa, että yhdellä ja vain yhdellä  $x_1$  pätee  $1 - \frac{1}{n} < f_n(x_1) < 1$  kaikilla  $n$ . Koska  $f_n$ :t ovat (kun  $n > 1$ ) parillisasteisia ja positiivikertoimisia polynomeja, ne ovat kasvavia ja niiden kuvaajat ovat alaspäin kuperia, kun  $x > 0$ . Lisäksi  $f_n(1) \geq 1$  ja  $f_n(0) = 0$ . Koska  $f_n$  on jatkuva ja kasvava, on olemassa  $a_n$  ja  $b_n$ ,  $0 < a_n < b_n < 1$ , siten, että  $f_n(a_n) = 1 - \frac{1}{n}$  ja  $f_n(b_n) = 1$ . Toisaalta siitä, että  $f_n$ :n kuvaaja on välillä  $[0, b_n]$  suoran  $y = \frac{x}{b_n}$  alapuolella, seuraa, että  $b_n - a_n < 1 - \frac{a_n}{b_n} < f(b_n) - f(a_n) = \frac{1}{n}$ . Koska  $f_{n+1}(a_n) = 1 - \frac{1}{n} < f_{n+1}(a_{n+1})$ , on oltava  $a_n < a_{n+1}$ . Koska  $f_{n+1}(b_n) = 1 + \frac{1}{n} > f_{n+1}(b_{n+1})$ , on oltava  $b_{n+1} < b_n$ . Jono  $(a_n)$  on kasvava ja jono  $(b_n)$  on vähenevä; lisäksi  $b_n - a_n \rightarrow 0$ , kun  $n \rightarrow \infty$ . Tästä seuraa, että

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x_1.$$

Jonojen yhteinen raja-arvo  $x_1$  on tehtävässä vaadittu luku; kaikille  $x > x_1$  on  $f_n(x) > 1$  tarpeeksi suurilla  $n$ :n arvoilla ja kaikilla  $x < x_1$  on  $f_n(x) < 1 - \frac{1}{n}$  kaikilla tarpeeksi suurilla  $n$ :n arvoilla.

**86.1.** Ellei tehtävän väite pitäisi paikkaansa, olisi  $2d = 1 + x^2$ ,  $5d = y^2 + 1$  ja  $13d = z^2 + 1$ , missä  $x$ ,  $y$  ja  $z$  ovat kokonaislukuja. Tällöin  $x$  olisi pariton, ja koska  $x^2 \equiv 1 \pmod{4}$ , niin  $d$  olisi pariton. Silloin  $y$  ja  $z$  olisivat parillisia,  $y = 2p$ ,  $z = 2q$ . Koska  $z^2 - y^2 = 8d = 4(p^2 - q^2)$ , olisi  $(p - q)(p + q) = 2d$ . Tämä on mahdotonta, sillä  $p - q$  ja  $p + q$  ovat joko molemmat parillisia tai molemmat parittomia; koska lukujen tulo on parillinen, ne ovat molemmat parillisia, ja  $d$  on parillinen. Ristiriita; siis tehtävän väite on tosi.

**86.2.** Kun suoritetaan peräkkäin kolme tason kiertoa (minkä hyvänsä pisteiden ympäri) siten, että kiertokulmien summa on  $360^\circ$ , niin kierroista yhdistetty kuvaus on translaatio (jokainen jana kuvautuu itsensä pituiseksi ja itsensä suuntaiseksi janaksi). Olkoon  $f$  se

translaatio, joka syntyy, kun yhdistetään  $120^\circ$ :en kierrot  $g_1, g_2$  ja  $g_3$  pisteiden  $A_1, A_2$  ja  $A_3$  ympäri. Koska  $f$  yhdistettynä 662 kertaa itsensä kanssa pitää pisteen  $P_0$  paikallaan,  $f$ :n on oltava identtinen kuvaus. Olkoon  $A_1 = f(A_1) = g_3(B)$ , missä  $B = g_2(g_1(A_1)) = g_2(A_1)$ . Nyt kolmiot  $A_2A_1B$  ja  $A_3BA_1$  ovat tasakylkiset, niillä on sama huippukulma ja yhteinen kanta  $A_1B$ . Tästä seuraa, että kolmiot ovat yhtenevät. Siis  $A_1A_2 = A_1A_3$ . Kolmioiden kantakulmat ovat  $30^\circ$ , joten  $\angle A_2A_1A_3 = 60^\circ$ . Kolmio  $A_1A_2A_3$  on tasasivuinen.

**86.3.** Jos  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  on viisikulmion kärjissä olevien lukujen muodostama vektori, merkitään  $s(\mathbf{x}) = x_1 + \dots + x_5$  ja  $f(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^5 (x_{k+1} - x_{k-1})^2$ , missä  $x_0 = x_5$  ja  $x_1 = x_6$ . Jos  $s(\mathbf{x}) > 0$  ja  $x_3 < 0$  jollakin  $x$ , voidaan suorittaa operaatio, jonka tuloksena saadaan uusi vektori  $\mathbf{y} = (x_1, x_2 + x_3, -x_3, x_4 + x_3, x_5)$ , jolle  $s(\mathbf{y}) = s(\mathbf{x})$ . Suoraan laskemalla saadaan

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = -2x_3s(\mathbf{x}) > 0.$$

Koska funktion  $f$  arvot ovat positiivisia kokonaislukuja, tehtävän operaation avulla  $f$ :n arvoa voidaan pienentää voidaan pienentää vain äärellisen monta kertaa.

**86.4.** Tarkastellaan tilannetta, jossa  $Y$  on sivun  $AB$  ja  $Z$  viereisen sivun  $BC$  sisäpiste. Koska kulmien  $\angle YBZ = \angle ABC$  ja  $\angle YXZ = \angle AOB$  summa on  $180^\circ$ , niin nelikulmio  $XYBZ$  on jännelikikulmio, ja sen ympäri voidaan piirtää ympyrä. Kulmat  $YBX$  ja  $YZX$  vastaavat samaa kaarta ja ovat siis yhtä suuret ja yhtä suuret kuin  $\angle ABO$ . Siis  $B, O$  ja  $X$  ovat samalla suoralla. Olkoon  $\alpha = \frac{180^\circ}{n}$ . Kolmion  $ABO$  ympäri piirretyn ympyrän halkaisija on  $d = \frac{a}{\cos \alpha}$ , missä  $a = |OA|$ .  $X$ :n etäisyys  $O$ :sta on suurimmillaan, kun  $BX$  on kolmion  $XYZ$  ympäri piirretyn ympyrän halkaisija; etäisyys on tällöin  $d - a$ . Kysytty kuvio on tähti, jonka muodostaa  $n$  kappaletta  $d - a$ :n pituista  $O$ :ssa kohtaavaa janaa, jotka kukin kuuluvat yhteen monikulmion kärjen ja sen keskipisteen kautta kulkevaan suoraan.

**86.5.** Olkoon  $f$  tehtävän ehdot täyttävä funktio. Jos  $t > 2$ , niin  $f(t) = f(t - 2 + 2) = f((t - 2)f(2))f(2) = 0$ . Olkoon  $0 \leq y < 2$  ja  $x \geq 0$ . Tehtävän yhtälöstä (i) nähdään, kun otetaan huomioon ehto (iii), että  $xf(y) \geq 2$  jos ja vain jos  $x + y \geq 2$  eli  $x \geq \frac{2}{f(y)}$  jos ja vain jos  $x \geq 2 - y$ . Mutta tämä merkitsee, että on oltava

$$f(y) = \frac{2}{2 - y}.$$

Rutiinilasku osoittaa, että funktio, jonka määrittelevät kaavat

$$f(y) = \begin{cases} \frac{2}{2 - y}, & \text{kun } 0 \leq y < 2, \\ 0, & \text{kun } y > 2, \end{cases}$$

todella toteuttaa tehtävän ehdot.

**86.6.** Tarkastellaan kaikkia koordinaattiakselien suuntaisia suoria, joilla on tehtävässä mainitun äärellisen joukon  $A$  pisteitä. Jokaisella suoralla yhdistetään (kasvavan  $x$ - tai  $y$ -koordinaatin suunnassa) kaksi ensimmäistä pistettä, kolmas ja neljäs piste jne. Jokainen piste tulee olemaan enintään kahden yhdistysjanan päätepiste; kullakin suoralla on



enintään yksi piste, joka ei kuulu yhteenkään yhdistysjanaan. Kaikki pisteet kuuluvat koordinaattiakselien suuntaisista janoista koostuviin toisiaan leikkaamattomiin murtoviivoihin. Jos tällainen murtoviiva on umpinainen, siinä on parillinen määrä sivuja (koska vierekkäiset sivut ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan ja murtoviivan nettokierto on  $4 \cdot 90^\circ$ ). Väritetään kullakin murtoviivalla peräkkäiset pisteet eri värein. Murtoviivoihin kuulumattomat pisteet voidaan värittää kummalla värillä tahansa. Jokaisella suoralla olevat  $A$ :n pisteet muodostavat tällöin erivärisiä pareja, ja kullakin suoralla on enintään yksi  $A$ :han kuuluva ”irtopiste”. Kullakin suoralla olevien valkoisten ja punaisten pisteiden lukumäärien ero on enintään yksi.

**87.1.** Liitetään jokaiseen permutaatioon jono  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , missä  $a_i = 1$ , jos  $i$  on permutaation kiintopiste, ja  $a_i = 0$  muulloin. Silloin  $k \cdot p_n(k)$  ilmoittaa, kuinka monta ykköstä on jonoissa, jotka liittyvät permutaatioihin, joilla on tasan  $k$  kiintopistettä ja  $\sum_{k=1}^n k p_n(k)$  on kaikissa jonoissa olevien ykkösten määrä. Toisaalta niitä jonoja, joissa  $i$ :s luku on ykkönen eli joille  $i$  on kiintopiste, on  $(n-1)!$  kappaletta, ja ykkösiä on siten yhteensä  $n \cdot (n-1)! = n!$  kappaletta.

**87.2** Koska  $KL \perp AB$  ja  $LM \perp AC$ , nelikulmion  $AKLM$  ympäri voidaan piirtää ympyrä. Se leikkaa sivun  $BC$  pisteissä  $L$  ja  $P$ . Kehäkulmalausesta ja siitä, että  $AL$  puolittaa kulman  $BAC$ , seuraa  $\angle NBC = \angle NAC = \angle NAB = \angle BPK$ . Siis  $NB \parallel KP$ . Kolmioilla  $KPN$  ja  $KPB$  on näin ollen sama kanta ja korkeus, joten niiden alat ovat yhtä suuret. Samoin osoitetaan, että  $NC \parallel PM$ , josta seuraa kolmioiden  $MPC$  ja  $MPN$  alojen yhtäsuuruus. Mutta kolmion  $ABC$  ala saadaan lisäämällä nelikulmion  $AKPM$  alaan kolmioiden  $KPB$  ja  $MPC$  alat ja nelikulmion  $AKNM$  ala saadaan lisäämällä nelikulmion  $AKPM$  alaan kolmioiden  $KNP$  ja  $MPN$  alat. Väite seuraa.

**87.3.** Jos  $(b_1, b_2, \dots, b_n)$  on jono lukuja, joille pätee  $0 \leq b_i \leq k-1$  kaikilla  $i$ , niin Cauchyn – Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$(b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n)^2 \leq (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \leq n(k-1)^2.$$

Sanotun ehdon täyttäviä jonoja on  $k^n$  kappaletta. Jos väli  $[0, (k-1)\sqrt{n}]$  jaetaan  $(k^n - 1)$ :een yhtä pitkään osaväliin, täytyy laatikkoperiaatteen nojalla ainakin yhteen väliin osua kaksi eri jonoihin liittyvää summaa  $\sum_{i=1}^n b_i x_i$  ja  $\sum_{i=1}^n c_i x_i$ . Jos  $a_i = b_i - c_i$ , niin summa  $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$  täyttää kaikki tehtävän ehdot.

**87.4.** Oletetaan, että funktiolle  $f$  on voimassa  $f(f(n)) = n + 1987$ . Silloin  $f(n) \neq f(m)$  aina kun  $n \neq m$ . Lisäksi  $f(n + 1987) = f(f(f(n))) = f(n) + 1987$  kaikilla  $n$ , josta induktiolla saadaan heti  $f(n + 1987 \cdot k) = f(n) + 1987 \cdot k$ . Tarkastellaan lukuja  $f(r)$ ,  $0 \leq r \leq 1986$ . Aina pätee  $f(r) = q + 1987 \cdot k$ , missä  $0 \leq q \leq 1986$ . Koska  $f(q) + 1987 \cdot k = f(q + 1987 \cdot k) = f(f(r)) = r + 1987 < 2 \cdot 1987$ , niin  $k \leq 1$ . Jos  $k = 0$ , niin  $f(q) = f(f(r)) = r + 1987$ . Jos  $k = 1$ , niin  $f(q) + 1987 = f(q + 1987) = f(f(r)) = r + 1987$ , joten  $f(q) = r$ . Luvut  $0, 1, \dots, 1986$  jakautuvat kahteen erilliseen joukkoon: joukon  $A$  luvuille on voimassa  $f(r) = q + 1986$  ja joukon  $B$  luvuille  $f(r) = q$ . Yllä sanotun mukaan, jos  $r \in A$ , niin  $f(r) \in B$  ja jos  $r \in B$ , niin  $f(r) \in A$ . Täten joukoissa  $A$  ja  $B$  on yhtä monta lukua. Mutta joukoissa on yhteensä pariton määrä lukuja. Ristiriita, joten tehtävän ominaisuuksilla varustettua funktiota ei ole olemassa.

**87.5.** Valitaan pisteiksi paraabelin  $y = x^2$  pisteet  $(1, 1), (2, 4), (3, 9), \dots, (n, n^2)$ . Jos  $1 \leq i < j < k \leq n$ , niin pisteiden  $(i, i^2), (j, j^2)$  ja  $(k, k^2)$  määrittämän kolmion ala saadaan laskettua puolisuunnikkaan alan kaavasta, ja se on

$$\frac{k^2 - i^2}{2}(k - i) - \frac{k^2 - j^2}{2}(k - j) - \frac{j^2 - i^2}{2}(j - i).$$

Ala on varmasti rationaalinen ja positiivinen. Pisteiden  $(i, i^2)$  ja  $(j, j^2)$  etäisyys on

$$(j - i)\sqrt{1 + (i + j)^2}.$$

Jotta etäisyys olisi rationaalinen, on oltava

$$1 + (i + j)^2 = \frac{p^2}{q^2},$$

missä  $p$  ja  $q$  ovat kokonaislukuja, joilla ei ole yhteisiä tekijöitä. Mutta silloin on oltava  $q = 1$  ja  $1 + (i + j)^2 = p^2$ . Tämä on mahdotonta, sillä  $(i + j)^2 < 1 + (i + j)^2 < (1 + i + j)^2$ .

**87.6.** Ellei  $f(k) = k^2 + k + n$  ole alkuluku kaikilla  $k, 0 \leq k < n - 1$ , on olemassa pienin  $y, y < n - 1$ , jolla  $f(y)$  on yhdistetty luku. Olkoon  $q$  luvun  $f(y)$  pienin alkutekijä. Oletetaan, että  $q \leq 2y$ . Kun  $x = 0, 1, \dots, y - 1$ , niin erotusten  $f(y) - f(x) = (y - x)(y + x + 1)$  tekijöissä ovat luvut  $0, 1, \dots, 2y$ , joten erotuksista yksi,  $f(y) - f(z)$ , on jaollinen  $q$ :lla. Koska  $f(z)$  on alkuluku ja  $f(y)$  jaollinen  $q$ :lla, niin  $f(z) = q$ . Toisaalta  $q = y - z$  tai  $q = y + z + 1$ . Mutta  $y - z \leq n - 2 < n < f(z)$  ja  $y + z + 1 \leq n - 2 + z + 1 < n + z + z^2 = f(z)$ . Ristiriita, joten on oltava  $q \geq 2y + 1$ . Koska  $q$  on  $f(y)$ :n pienin alkutekijä,  $y^2 + y + n = f(y) \geq q^2 \geq 4y^2 + 4y + 1$ .

Tästä seuraa, että  $y \leq \sqrt{\frac{n}{3}}$ , mikä taas on ristiriidassa tehtävän oletuksen kanssa.

**88.1.** Olkoon ympyröiden keskipiste  $O$  ja janan  $BC$  keskipiste  $N$ . Pythagoraan lauseen nojalla

$$\begin{aligned} BC^2 + CA^2 + AB^2 &= (BP + PC)^2 + PA^2 + PC^2 + PA^2 + BP^2 \\ &= 2(PA^2 + PB^2 + PC^2 + BP \cdot PC). \end{aligned}$$

Lausutaan janat ympyröiden säteiden ja kulman  $\alpha = \angle OPA$  avulla:  $PA = 2r \cos \alpha, BP = BN - PN = \sqrt{R^2 - r^2 \cos^2 \alpha} - r \sin \alpha, PC = PN + NC = BN + PN = \sqrt{R^2 - r^2 \cos^2 \alpha} + r \sin \alpha$ . Lisäksi pisteen potenssia koskevan lauseen nojalla  $BP \cdot PC = (R + r)(R - r)$ . Kun nämä sijoitetaan tutkittavaan summaan, sen arvoksi saadaan

$$2(4r^2 \cos^2 \alpha + 2(R^2 - r^2 \cos^2 \alpha + r^2 \sin^2 \alpha) + R^2 - r^2) = 6R^2 + 2r^2.$$

Koska tämä ei riipu  $\alpha$ :sta, summan arvo on  $B$ :stä riippumaton; kohdassa (I) kysytyn joukon ainoa alkio on  $6R^2 + 2r^2$ .

Pisteen  $A$  kautta piirretty suoran  $BC$  suuntainen suora leikkaa isomman ympyrän pisteissä  $C'$  ja  $B'$ ; valitaan pisteiden nimet niin, että  $PAB'B$  on suorakulmio. Janan  $AB$  keskipiste  $Q$  on myös janan  $PB'$  keskipiste. Kun  $B$  kiertää ympyrän kehän, myös  $B'$  kiertää sen, ja keskipiste  $Q$  piirtää isomman ympyrän kanssa pisteen  $P$  suhteen suhteessa  $1 : 2$  homoteettisen ympyrän.

**88.2.** Osoitetaan, että tehtävän mukainen nollien liittäminen  $B$ :n alkioihin onnistuu silloin ja vain silloin, kun  $n$  on parillinen. Osoitetaan ensin, että jokainen  $B$ :n alkio kuuluu tasan kahteen joukoista  $A_n$ . Koska jokainen  $B$ :n alkio kuuluu ainakin kahteen joukoista  $A_j$ , niin jokainen  $A_j$  on joukkojen  $A_i \cap A_j$ ,  $j \neq i$ , yhdiste. Jos olisi  $a \in A_1 \cap A_2 \cap A_3$ , niin ehdon (b) perusteella  $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap A_3 = \{a\}$ , ja  $A_1$ :ssä olisi enintään  $2n - 1$  alkioita  $a$ ,  $A_1 \cap A_4, \dots, A_1 \cap A_{2n+1}$ . Oletetaan sitten, että vaadittu nollien ja ykkösten sijoittelu on tehty. Muodostetaan  $2n \times 2n$  taulukko, jonka  $i$ :nnellä rivillä ja  $j$ :nessä sarakkeessa on  $A_i \cap A_j$ :n alkion numero, jos  $i \neq j$ . Taulukon päälävistäjän  $i$ :nnelle riville sijoitetaan  $A_i \cap A_{2n+1}$ :n alkion numero. Tällöin taulukon jokaisella rivillä on  $n$  nollaa, ja koko taulukossa siis  $2n^2$  nollaa. Koska taulukko on symmetrinen, niin päälävistäjän ulkopuolella olevien nollien määrä on parillinen. Siten myös päälävistäjällä olevien nollien määrä on parillinen. Päälävistäjällä olevien nollien määrä on joukon  $A_{2n+1}$  alkioihin liittyvien nollien määrä eli  $n$ . Siis  $n$  on välttämättä parillinen.

On vielä osoitettava, että nollien sijoitus on mahdollinen aina kun  $n$  on parillinen. Kun  $n = 2$ , sijoittelu käy taulukon

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mukaisesti. Kun  $n = 2k$ , sijoittelu saadaan toistamalla taulukkoa  $T$ , siis  $2n$ -rivisen taulukon

$$\begin{bmatrix} T & T & \dots & T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T & T & \dots & T \end{bmatrix}$$

mukaisesti.

**88.3.** Pienillä  $n$ :n arvoilla  $f(n)$ :n arvot ovat

$n$	:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
$f(n)$	:	1	1	3	1	5	3	7	1	9	5	13	3	11	7	15	1	17

Muotoillaan tämän perusteella hypoteesi:  $f(n)$  on luku, joka saadaan lukemalla  $n$ :n binääriesitys takaperin. Riittää, kun hypoteesi todistetaan parittomille  $n$ :ille, koska  $f(2n) = f(n)$ . Käytetään induktiotodistusta; väite on tosi, kun  $n = 1$  ja  $n = 3$ . Olkoon  $n = 4m + 1 = \sum_{j=0}^k a_j 2^j$ ,  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 0$ . Silloin  $m = \sum_{j=2}^k a_j 2^{j-2}$  ja  $2m + 1 = 1 + \sum_{j=1}^k a_j 2^{j-1}$ .

Induktiooletuksen perusteella  $f(2m + 1) = 2^{k-1} + \sum_{j=2}^k a_j 2^{k-1-(j-1)} = 2^{k-1} + \sum_{j=2}^k a_j 2^{k-j}$  ja  $f(m) = \sum_{j=2}^k a_j 2^{k-j}$ , joten

$$f(4m + 1) = 2f(2m + 1) - f(m) = 2^k + \sum_{j=2}^k a_j 2^{k-j} = \sum_{j=0}^k a_j 2^{k-j}.$$

Samoin, jos  $n = 4m + 3 = \sum_{j=0}^k a_j 2^j$ ,  $a_0 = a_1 = 1$ , saadaan  $m = \sum_{j=2}^k a_j 2^{j-2}$ ,  $2m + 1 = 1 + \sum_{j=2}^k a_j 2^{j-1}$  ja

induktio-oletukseen nojautuen

$$f(4m + 3) = 3f(2m + 1) - 2f(m) = 2^k + 2^{k-1} + \sum_{j=2}^k a_j 2^{k-j}.$$

Hypoteesi on todistettu.

Tehtävä ratkaistaan, kun lasketaan, kuinka monella luvulla  $n$ ,  $1 \leq n \leq 1988$  on binääriesitys, joka on sama alusta loppuun ja lopusta alkuun. Tällaisia lukuja kutsutaan binääripalindromeiksi. Tällaisia  $2m$ -numeroisia lukuja on  $2^{m-1}$  kappaletta (ensimmäinen numero on 1 ja seuraavat  $m - 1$  numeroa voi valita vapaasti) ja  $2m - 1$  numeroisia myös  $2^{m-1}$  kappaletta (ensimmäinen numero 1, seuraavat  $m - 1$  voi valita vapaasti). Nyt  $2^{10} < 1988 < 2^{11}$ . Lukua 2048 pienempiä binääripalindromeja on siten  $1 + 1 + 2 + 2 + 4 + 4 + 8 + 8 + 16 + 16 + 32 = 94$  kappaletta. Koska  $1988 = (11111000100)_2$ , vain kaksi 11-numeroisista binääripalindromeista on suurempia kuin 1988. Kysytty luku on 92.

**88.4.** Epäyhtälön vasemman ja oikean puolen erotus voi vaihtaa merkkiään vasemman puolen epäjatkuvuuskohdissa  $k$ ,  $k = 1, 2, \dots, 70$  ja astetta 70 olevan polynomin

$$P(x) = 5 \prod_{j=1}^{70} (x - j) - 4 \sum_{k=1}^{70} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{70} (x - j)$$

nollakohdissa  $x_i$ . Koska epäyhtälön vasen puoli lähestyy  $-\infty$ :tä, kun  $x$  lähestyy  $k$ :ta vasemmalta, ja  $+\infty$ :tä, kun  $x$  lähestyy  $k$ :ta oikealta, niin  $i < x_i < i + 1$ , kun  $i = 1, 2, \dots, 69$  ja  $70 < x_{70}$ . Polynomin  $P$  juurien summa on laskettavissa  $P$ :n astetta 69 olevan termin kertoimesta, ja se on  $\sum_{j=1}^{70} j + \frac{4}{5} \sum_{k=1}^{70} k$  Kysytty välien pituuksien summa on

$$\sum_{i=1}^{70} (x_i - i) = \frac{4}{5} \sum_{k=1}^{70} k = 1988.$$

**88.5.** Olkoon  $BC = a$ ,  $AB = c$ ,  $CA = b$ . Olkoot  $X$  ja  $Y$  kolmioiden  $ABD$  ja  $ADC$  sisään piirrettyjen ympyröiden keskipisteet,  $r$  ja  $R$  niiden säteet ja  $E$  sekä  $F$  pisteet, joissa kolmion  $ABD$  sisään piirretty ympyrä sivuaa  $AB$ :tä ja  $AD$ :tä sekä  $G$  ja  $H$  pisteet, joissa kolmion  $ADC$  sisään piirretty ympyrä sivuaa  $AD$ :tä ja  $AC$ :tä. Olkoon  $AD = h$ . Jos  $N$  on se  $AC$ :n piste, jossa  $AC \perp XN$  ja  $P$  se  $XN$ :n piste, jossa  $YP \perp XN$ , niin

$$\begin{aligned} XN &= EA = AF = h - r \\ XP &= XN - PN = XN - YH = h - r - R \\ YP &= HN = AH - AN = AG - r = h - R - r. \end{aligned}$$

Siis  $XPY$  on tasakylkinen suorakulmainen kolmio. Muta tällöin myös  $KEX$  ja  $KAL$  ovat tasakylkisiä suorakulmaisia kolmioita, ja  $KE = r$ ,  $AK = XN + KE = h$ . Täten

$$\frac{S}{T} = \frac{ah}{h^2} = \frac{a}{h} = \frac{a^2}{ah} = \frac{a^2}{bc} = \frac{b^2 + c^2}{bc} \geq 2.$$

**88.6.** Oletetaan, että

$$\frac{a^2 + b^2}{ab + 1} = k,$$

missä  $k$  on positiivinen kokonaisluku mutta  $k$  ei ole kokonaisluvun neliö. Erityisesti  $k \geq 2$ . Silloin  $a$  ja  $b$  toteuttavat yhtälön

$$a^2 - kab + b^2 = k. \quad (1)$$

Yhtälön (1) kaikille ratkaisuille  $(a, b)$  pätee joko  $a > 0$  ja  $b > 0$  tai  $a < 0$  ja  $b < 0$ . (Selvästikin  $a, b \neq 0$  ja jos olisi  $ab < 0$ , olisi  $a^2 - kab + b^2 > k$ .) Tarkastellaan kaikkia niitä (1):n ratkaisuja, joissa  $a > 0$  ja  $b > 0$ . Tällöin aina  $a \neq b$ , sillä jos olisi  $a = b$ , olisi  $(2 - k)a^2 = k$ , missä vasen puoli on ei-positiivinen. Olkoon erityisesti  $(a, b)$  se tarkasteltavista ratkaisuista, jossa  $a$  on pienin mahdollinen. Jos (1):tä pidetään  $a$ :n toisen asteen yhtälönä, niin (1):llä on kaksi juurta,  $a$  ja  $a_1$ . Koska  $a + a_1 = kb$ , myös  $a_1$  on kokonaisluku. Yllä sanotun nojalla  $a_1 > 0$ , koska  $b > 0$ . Lisäksi  $aa_1 = b^2 - k$ , joten

$$a_1 = \frac{b^2 - a}{a} < \frac{a^2 - 1}{a} < a.$$

Tämä on ristiriidassa  $a$ :n oletetun minimaalisuuden kanssa!

**89.1.** Olkoon  $A'_i = B_i \cup C_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 117$ , missä  $B_i = \{i + 117 \cdot k \mid 0 \leq k \leq 8\}$  ja  $C_i = \{1990 - x \mid x \in B_i\}$ . Selvästi  $A'_i \cap A'_j = \emptyset$ , kun  $i \neq j$ ,  $\bigcup_{i=1}^{117} B_i = \{1, 2, \dots, 936\}$  ja  $\bigcup_{i=1}^{117} C_i = \{1054, 1055, \dots, 1989\}$ . Kaikkien joukkojen  $A'_i$  alkioiden summa on 15920. Olkoon nyt

$$\begin{aligned} A_i &= (A'_i \setminus \{i\}) \cup \{60 - i\} \cup \{995 + 2i - 60\}, & \text{kun } 1 \leq i \leq 59, \\ A_i &= (A'_i \setminus \{i\}) \cup \{177 - i\} \cup \{995 + 2i - 177\}, & \text{kun } 60 \leq i \leq 117. \end{aligned}$$

Näissä operaatioissa  $A'_i$ :n ja  $A'_{60-i}$ :n tai  $A'_i$ :n ja  $A'_{117-i}$ :n pienimmät alkiot vaihdetaan keskenään ja mukaan otetaan lisäksi kaikki luvut 937, 938, ..., 1053, yksi kuhunkin joukkoon. Täten  $A_i$ :t ovat edelleen erillisiä ja  $\bigcup_{i=1}^{117} A_i = \{1, 2, \dots, 1989\}$ . Jokaisen joukon  $A_i$  alkioiden summa on  $A'_i$ :n alkioiden summa lisättynä 995:llä. Summat ovat samat.

**89.2.** Olkoon  $I$  kolmion  $ABC$  kulmanpuolittajien leikkauspiste. Silloin (esimerkiksi)  $\angle ACA_0 = 90^\circ$ . Jos kolmion  $ABC$  kulmat ovat  $2\alpha$ ,  $2\beta$  ja  $2\gamma$ , niin  $\angle A_1IC = \alpha + \gamma$  ja koska  $\angle BAA_1 = \angle BCA_1$ , niin  $\angle ICA_1 = \alpha + \gamma$ . Siis  $IA_1 = A_1C$ . Toisaalta  $\angle IA_0C = 90^\circ - \angle A_0IC = 90^\circ - \alpha - \gamma$  ja  $\angle A_1CA_0 = 90^\circ - \angle A_1CI = 90^\circ - \alpha - \gamma$ . Siis  $A_0A_1 = A_1C$  ja edelleen  $IA_1 = A_1C$ . Täten kolmioilla  $IA_1C$  ja  $CA_1A_0$  on sama ala. Tehtävän ensimmäinen väite seuraa heti.

Olkoon  $H$  kolmion  $ABC$  korkeusjanojen leikkauspiste. Kulman kylkien kohtisuoruuden nojalla  $\angle BCH = \angle BAH$  ja  $\angle HBC = \angle HAC$ . Siis  $\angle BHC = 180^\circ - \angle BAC$ . Jos  $X$  on pisteen  $H$  peilikuva sivun  $BC$  suhteen, niin  $\angle BXC + \angle BAC = 180^\circ$ , joten  $X$  on samalla ympyrällä kuin  $A$ ,  $B$  ja  $C$ . Jos  $Y$  ja  $Z$  ovat vastaavasti  $H$ :n peilikuvat sivujen  $CA$  ja  $AB$  suhteen, niin  $AZBXC$  on ympyrän sisään piirretty kuusikulmio, jonka ala on kaksi

kertaa kolmion  $ABC$  ala. Koska  $A_1$ ,  $B_1$  ja  $C_1$  ovat kaarien  $BC$ ,  $CA$  ja  $AB$  keskipisteet, kolmioiden  $BA_1C$ ,  $CB_1A$  ja  $AC_1B$  alat ovat suurempia tai yhtä suuria kuin kolmioiden  $BXC$ ,  $CYA$  ja  $AZB$  alat. Kuusikulmion  $AC_1BA_1CB_1$  ala on siten ainakin kaksi kertaa niin suuri kuin kolmion  $ABC$  ala. Tehtävän toinen väite saadaan, kun tämä erisuuruus yhdistetään jo todistettuun ensimmäiseen väitteeseen.

**89.3.** Tehdään vastaoletus  $k \geq \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$ . Jokaista  $S$ :n pistettä  $P$  kohden on ainakin  $\binom{k}{2}$   $S$ :n pisteparia  $(A, B)$ , joille  $P$  on janan  $AB$  keskinormaalilla. Tällaisia kolmikkoja  $(A, B; P)$  on ainakin

$$n \cdot \binom{k}{2} = \frac{n}{2}k(k-1) \geq \frac{n}{2}\left(\sqrt{2n} + \frac{1}{2}\right)\left(\sqrt{2n} - \frac{1}{2}\right) = n^2 - \frac{1}{8} > n(n-1) = 2\binom{n}{2}$$

kappaletta. Jokin pari  $(A, B)$  esiintyy kolmikoissa useammin kuin kahdesti; vastaavat pisteet  $P_1$ ,  $P_2$  ja  $P_3$  ovat kaikki  $AB$ :n keskinormaalilla ja siis samalla suoralla.

**89.4.** Olkoon  $AD = R$  ja  $BC = r$ . Koska  $P$ -keskisen  $h$ -säteisen ympyrän on sivuttava  $A$ -keskistä  $R$ -säteistä ympyrää,  $B$ -keskistä  $r$ -säteistä ympyrää ja suoraa  $DC$ , nähdään jokseenkin välittömästi, että suurin mahdollinen  $h$ :n arvo esiintyy tilanteessa, jossa  $AD \perp DC$  ja  $BC \perp DC$ . Tässä tapauksessa

$$CD^2 = (R+r)^2 - (R-r)^2 = 4rR, \quad (1)$$

ja jos  $CD$  ja  $P$ -keskinen  $h$ -säteinen ympyrä sivuavat pisteessä  $M$ , niin

$$\begin{aligned} CD = CM + MD &= \sqrt{(r+h)^2 - (r-h)^2} + \sqrt{(R+h)^2 - (R-h)^2} \\ &= 2\sqrt{rh} + 2\sqrt{Rh}. \end{aligned} \quad (2)$$

Yhtälöistä (1) ja (2) seuraa

$$\frac{1}{\sqrt{h}} = \frac{1}{\sqrt{r}} + \frac{1}{\sqrt{R}}.$$

Koska yleisessä tapauksessa  $h$  on pienempi, saadaan tehtävän väitteenä oleva epäyhtälö.

**89.5.** Olkoon  $N = ((n+1)!)^2 + 1$ . Silloin  $k+1$  on luvun  $N+k$  aito tekijä, kun  $k = 1, 2, \dots, n$ . Jos nyt olisi  $N+k = p^m$  jollakin alkuluvulla  $p$ , niin olisi  $k+1 = p^j$ ,  $0 < j < m$ . Mutta koska  $1+k \leq n+1$ , niin  $p^{j+1}$  olisi  $((n+1)!)^2$ :n tekijä ja  $((n+1)!)^2 + k$ :n tekijä. Erityisesti  $p$  olisi  $k$ :n ja  $k+1$ :n tekijä. Siispä mikään  $n$ :stä luvusta  $N+1, N+2, \dots, N+n$  ei ole alkuluvun kokonaislukueksponenttinen potenssi.

**89.6.** Tehtävässä tarkastellaan lukujoukkoa  $S_n$ , jonka  $2n$  suuruusjärjestyksessä olevaa alkioita (esim.  $1, 2, \dots, 2n$ ) jakautuvat  $n$ :ksi kaksospariksi, esim.  $\{1, 1+n\}$ ,  $\{2, 2+n\}$ ,  $\dots$ ,  $\{n, 2n\}$ . Tälälisen joukon permutaation  $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$  sanomme olevan tyyppiä  $T_k$ , jos lukuparien  $(x_i, x_{i+1})$  joukossa on  $k$  kaksosparia. Olkoon  $F_k(n)$  tyyppiä  $T_k$  olevien permutaatioiden lukumäärä.

Olkoon nyt  $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$  jokin joukon  $S_n$  tyyppiä  $T_0$  oleva permutaatio. Poistetaan  $x_{2n}$  ja sen kaksospari. Syntyvä  $2(n-1)$ -alkioinen joukko  $S_{n-1}$  muodostuu edelleen kaksospareista, ja poiston jälkeen jäävä permutaatio on joko tyyppiä  $T_0$  tai  $T_1$ . Edellisessä tapauksessa  $2n(2n-2)$  alkuperäisen joukon eri permutaatiota tuottavat saman  $S_{n-1}$ :n permutaation ( $x_{2n}$  voi olla mikä tahansa joukon alkio ja  $x_{2n-1}$  voi olla mikä tahansa muu kuin  $x_{2n}$  tai sen kaksospari). Jälkimmäisessä tapauksessa  $2n$  alkuperäisen joukon eri permutaatiota tuottavat saman  $S_{n-1}$ :n permutaation ( $x_{2n}$  voi olla mikä hyvänsä joukon alkio, mutta  $x_{2n}$ :n parin on oltava täsmälleen tuotetun permutaation vierekkäin olevien alkioiden välissä). Siis

$$F_0(n) = 2n((2n-2)F_0(n-1) + F_1(n-1)). \quad (1)$$

Olkoon sitten  $(x_1, x_s, \dots, x_{2n})$  jokin joukon  $S_n$  tyyppiä  $T_1$  oleva permutaatio. Kun tästä permutaatiosta poistetaan sen ainoa kaksospari  $(x_i, x_{i+1})$ , syntyy joko  $T_0$ - tai  $T_1$ -tyyppinen permutaatio. Mahdollisia kaksospareja on  $n$  kappaletta, ja kukin voidaan järjestää kahdella tavalla. Edellisessä tapauksessa pari voi olla missä hyvänsä  $2n-1$ :stä eri asemasta, jälkimmäisessä tapauksessa täsmälleen siinä asemassa, jonka määrittää syntyvässä  $T_1$ -permutaatiossa oleva kaksospari. Siis

$$F_1(n) = 2n((2n-1)F_0(n-1) + F_1(n-1)). \quad (2)$$

Kun (2):sta vähennetään (1), saadaan  $F_1(n) = F_0(n) + 2nF_0(n-1)$ . Kun tämä sijoitetaan (1):een, saadaan palautuskaava

$$F_0(n) = 2n((2n-1)F_0(n-1) + (2n-2)F_0(n-2)). \quad (3)$$

Jos  $P(n)$  on  $T_0$ -tyyppisten permutaatioiden lukumäärän suhde kaikkien permutaatioiden lukumäärään, niin (3):n perusteella

$$P(n) = \frac{F_0(n)}{(2n)!} = P(n-1) + \frac{P(n-2)}{(2n-3)(2n-1)},$$

josta

$$P(n) - P(n-1) < \frac{1}{(2n-3)(2n-1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2n-3} - \frac{1}{2n-1} \right).$$

Selvästi  $P(1) = 0$  (kuvatussa prosessissa poistettiin aina pareja!), joten

$$P(n) = \sum_{k=2}^n (P(k) - P(k-1)) < \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2n-1} \right) < \frac{1}{2}.$$

Tämä on yhtäpitävää väitteen kanssa.

**90.1.** Osoitetaan ensin, että piste  $A$  on pisteiden  $G$  ja  $C$  välissä. Selvästikin  $\angle EDM < \angle EDB$ . Yhtä suurina kehäkulmina  $\angle FEB = \angle EDM$  ja  $\angle CAB = \angle BDE$ . Täten  $\angle FEB < \angle CAB$ , mistä väite seuraakin.

Piirretään kuvioon janat  $DA$ ,  $DM$  ja  $DB$ . Nyt  $\angle CEF = \angle DEG = \angle EMD$  (kehäkulmat) ja  $\angle FCE = \angle MAD$ . Silloin kolmiot  $CEF$  ja  $AMD$  ovat yhdenmuotoiset, joten  $\frac{CE}{EF} = \frac{AM}{DM}$ . Toisaalta kehäkulmalausetta ja kolmion kulman vieruskulmaa koskevaa lausetta soveltaen saadaan  $\angle ECG = \angle DBM$  ja  $\angle CGE = \angle CEF - \angle ECG = \angle DME - \angle DBM = \angle MDB$ , joten myös kolmiot  $CGE$  ja  $BDM$  ovat yhdenmuotoiset ja  $\frac{GE}{CE} = \frac{DM}{MB}$ . Kun johdetut verrannot kerrotaan keskenään, saadaan

$$\frac{GE}{EF} = \frac{AM}{AB} = \frac{tAB}{(1-t)AB} = \frac{t}{1-t}.$$

**90.2.** Sanomme kahta  $E$ :n pistettä *naapureiksi*, mikäli jommalla kummalla pisteiden välisistä ympyränkaarista on sisäpisteinä täsmälleen  $n$  joukon  $E$  pistettä. Etsimme pienintä lukua  $k$ , jolle jokainen  $E$ :n  $k$ -alkioinen osajoukko sisältää ainakin kaksi pistettä, jotka ovat naapureita.

Yhdistetään jokaiset kaksi naapuria janalla. Koska joka pisteellä on tasan kaksi naapuria, syntyy yhdestä tai useammasta suljetusta murtoviivasta koostuva kuvio. Numeroidaan  $E$ :n pisteet ympyrän kehällä järjestyksessä numeroin  $0, 1, 2, \dots, 2n-2$ . Tällöin kuvioon kuuluva murtoviiva sisältää pisteet  $r+s(n+1) \pmod{2n-1}$ , missä  $r$  on jokin kyseisen murtoviivan piste ja  $s = 0, 1, \dots, 2n-2$  (samat pisteet saattavat esiintyä jonossa useamminkin). Koska  $d = (n+1, 2n-1)$  on pienin muotoa  $x(n+1) + y(2n-1)$  oleva positiivine kokonaisluku, murtoviiva, johon kuuluu piste nolla sisältää pisteet  $0, d, 2d, \text{jne.}$ , Tästä päätellään, että jokaisen suljetun murtoviivan kärkien lukumäärä on  $(2n-1)/d$ . On olemassa kaksi vaihtoehtoa:

(a) Jos  $2n-1$  ei ole jaollinen kolmella, niin

$$d = (2n-1, 2(n+1)) = (2n-1, (2n-1) + 3) = (2n-1, 3) = 1.$$

Suljettuja murtoviivoja on vain yksi.

(b) Jos  $3 \mid (2n-1)$ , niin  $d = 3$ . Suljettuja murtoviivoja on kolme.

Tämän jälkeen pienin luvun  $k$  arvo on helppo päätellä kummassakin tapauksessa erikseen. Väritys on hyvä, jos ja vain jos kaksi saman suljetun murtoviivan peräkkäistä pistettä on mustia. Tapauksessa (a) pienin  $k$  on  $n$ , tapauksessa (b) pienin  $k$ :n arvo on

$$3 \left( \frac{2n-1}{6} - \frac{1}{2} \right) + 1 = n - 1.$$

**90.3.** Osoitetaan, että ainoa ratkaisu on  $n = 3$ . Oletetaan että  $n = 3^k d$ , missä  $k \geq 0$  ja  $(d, 6) = 1$  on ratkaisu. Osoitetaan ensin, että  $k \leq 1$ . Olkoon  $k \geq 2$ . Sovelletaan kaavaa  $x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1)$  induktiivisesti; saadaan

$$2^n + 1 = 2^{3^k d} + 1 = (2^d + 1) \prod_{m=0}^{k-1} (2^{2 \cdot 3^m d} - 2^{3^m d} + 1).$$



Kun käytetään hyväksi tietoa  $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$  ja kokeillaan arvoja  $t = 1, 3, 5$ , nähdään, että  $2^{2t} - 2^t + 1 \equiv 3 \pmod{9}$  kaikilla parittomilla  $t$ . Siispä yllä olevassa hajotelmassa tätä muotoa olevat tulon tekijät eivät ole jaollisia 9:llä. Koska kuitenkin  $2^n + 1$  (joka on jaollinen  $n^2$ :lla) on jaollinen  $3^{2k}$ :lla, niin  $2^d + 1$  on jaollinen  $3^k$ :lla. Mutta kun sovelletaan tietoja  $(d, 6) = 1$  ja  $2^6 \equiv 1 \pmod{9}$  ja kokeillaan arvoja  $d = 1$  ja  $d = 5$  nähdään, että 9 ei ole  $(2^d + 1)$ :n tekijä. Siis  $k = 0$  tai  $k = 1$ .

Todistetaan sitten, että  $d = 1$ . Tähän tarvitaan aputuloksena: jos  $a^r \equiv 1 \pmod{p}$ , niin  $a^{(r,s)} \equiv 1 \pmod{p}$ . Aputuloksen todistamiseksi valitaan  $\varepsilon$  pienimmäksi eksponentiksi, jolle  $a^\varepsilon \equiv 1 \pmod{p}$ . Jos  $r$  ei ole jaollinen  $\varepsilon$ :lla, niin  $r = f\varepsilon + g$ , missä  $0 < g < \varepsilon$ . Tällöin  $a^g \equiv a^{f\varepsilon+g} = a^r \equiv 1$ , mikä on vastoin  $\varepsilon$ :in määritelmää. Tästä seuraa  $a^{(r,s)} = a^{h\varepsilon} \equiv 1$  eli väite.

Oletetaan sitten, että  $d \neq 1$ . Olkoon  $p$  luvun  $d$  pienin alkutekijä. Välttämättä  $p \geq 5$ . Koska  $2^n + 1$  on jaollinen  $p$ :llä,  $2^n \equiv -1 \pmod{p}$  eli  $2^{2n} \equiv 1 \pmod{p}$ . Toisaalta Fermat'n pienen lauseen nojalla  $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , joten aputuloksen perusteella  $2^j \equiv 1 \pmod{p}$ , missä  $j = (p-1, 2n)$ . Nyt joko  $2n = 2d$  tai  $2n = 6d$ , ja  $(j, d) = 1$ . Tästä seuraa, että  $j|6$  eli  $j$  on jokin luvuista 1, 2, 3 ja 6. Koska  $2^j - 1$  on jaollinen  $p$ :llä, niin jokin luvuista 1, 3, 7 ja 63 on jaollinen  $p$ :llä. Ainoa mahdollisuus on  $p = 7$ . Toisaalta kokeilemalla eksponenteilla 0, 1, 2, ..., 5 nähdään, että  $2^m + 1$  ei ole millään kokonaisluvulla  $m$  jaollinen 7:llä. Oletus  $7|(2^n + 1)$  johti siis ristiriitaan.

On siis  $d = 1$ , ja ainoa ratkaisu  $n > 1$  on  $n = 3^1 \cdot 1 = 3$ .

**90.4.** Kun tehtävän funktionaaliyhtälöön sijoitetaan  $x = 1$ , nähdään, että  $y = f(1)/f(f(y))$ . Jos  $f(y_1) = f(y_2)$ , niin  $y_1 = y_2$ , eli  $f$  on injektio. Sijoittamalla edelleen  $y = 1$  saadaan  $f(f(1)) = f(1)$ , joten injektivisyyden perusteella  $f(1) = 1$ . Siis

$$f(f(y)) = \frac{1}{y} \quad (1)$$

kaikilla  $y$ . Tästä ja funktionaliyhtälöstä seuraa  $f(1/y) = 1/f(y)$ . Kun alkuperäiseen yhtälöön sijoitetaan  $y = f(1/t)$ , saadaan

$$f(xt) = f(x)f(t). \quad (2)$$

Heti nähdään, että ehdot (1) ja (2) toteuttava funktio  $f$  toteuttaa tehtävän funktionaaliyhtälön.

Ehdon (2) toteuttava funktio voidaan määrittellä mielivaltaisesti alkuluvuille  $p_i$  ja laajentaa se positiivisten kokonaislukujen joukkoon kaavalla

$$f(p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_k^{n_k}) = f(p_1)^{n_1} f(p_2)^{n_2} \cdots f(p_k)^{n_k}. \quad (3)$$

( $n_i$ :t kokonaislukuja). (2):n perusteella funktio voidaan edelleen jatkaa positiivisten rationaalilukujen joukkoon asettamalla

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{f(p)}{f(q)}.$$

Tällainen funktio toteuttaa ehdon (1) jos ja vain jos se toteuttaa ehdon (1) kaikilla alkuluvuilla. Olkoon  $p_j$   $j$ :s alkuluku. Määritellään  $f(p_{2j}) = p_{2j-1}$  ja  $f(p_{2j-1}) = 1/p_{2j}$ . Suora lasku osoittaa, että  $f(f(p)) = 1/p$  kaikilla alkuluvuilla. Tehtävän ehdot toteuttava funktio saadaan, kun tämä funktio laajennetaan positiivisten rationaalilukujen joukkoon kaavoilla (3) ja (2).

**90.5.** Merkitään  $W_A$ :lla,  $W_B$ :llä ja  $W_T$ :llä niiden lukujen  $n_0$  joukkoja, joilla  $A$ :lla on voittostrategia,  $B$ :llä on voittostrategia tai kummallakaan pelaajalla ei ole voittostrategiaa. Oletetaan, että  $\{m, m+1, \dots, 1990\} \subset W_A$ . Todistetaan ensin, että jos  $mp^r \leq s \leq 1990$ , missä  $p^r$  on suurin  $s$ :n alkuluvun potenssin muotoinen tekijä, niin myös ehdon  $\sqrt{s} \leq n_0 \leq m$  toteuttavat luvut  $n_0$  kuuluvat joukkoon  $W_A$ . Jos nimittäin  $\sqrt{s} \leq n_0 < m$ , niin  $A$  voi valita  $n_1 = s$ . Silloin pelaaja  $B$  joutuu valitsemaan ehdon  $m \leq s/p^r \leq n_2 < s \leq 1990$  toteuttavan luvun  $n_2$ . Koska  $n_2 \in W_A$ ,  $A$  voittaa.

Koska  $45^2 > 1990$ , niin  $\{45, 46, \dots, 1990\} \subset W_A$ . Valitsemalla  $m = 45$ ,  $s = 420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$  nähdään, että  $\{21, 22, \dots, 44\} \subset W_A$ . Muuttujien arvot  $m = 21$ ,  $s = 168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$ ;  $m = 13$ ,  $s = 105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$  ja  $m = 11$ ,  $s = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$  antavat  $\{13, 14, \dots, 20\} \subset W_A$ ,  $\{11, 12\} \subset W_A$  ja  $\{8, 9, 10\} \subset W_A$ . Siis  $\{8, 9, \dots, 1990\} \subset W_A$ .

Olkoon sitten  $n_0 > 1990$ . Nyt pelaaja  $A$  voi valita väliltä  $[n_0, n_0 + 142]$  luvun  $n_1$ , joka on jaollinen luvulla  $143 = 11 \cdot 13$ . Silloin pelaaja  $B$  joutuu valitsemaan luvun  $n_2$ , jolle pätee  $11 \leq n_2 \leq (142 + n_0)/2 < n_0$ . Kun pelaaja  $A$  soveltaa tätä taktiikkaa riittävän kauan, joutuu pelaaja  $B$  lopulta valitsemaan luvun väliltä  $[11, 1990]$ , jolloin  $A$  pystyy varmistamaan voiton. Siis kaikki lukua 1990 suuremmat luvut kuuluvat joukkoon  $W_A$ .

Tarkastellaan sitten tapausta  $n_0 \leq 5$ . Koska pienin kolmen eri alkuluvun tulo on  $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ , niin pelaaja  $A$  joutuu valitsemaan luvun, joka on enintään kahden alkulukupotenssin tulo. Tämän jälkeen  $B$  voi valita seuraavaksi luvuksi joko pienemmän näistä alkulukupotensseista tai peräti luvun 1; joka tapauksessa  $n_2 < n_0$ . Jatkamalla näin pelaaja  $B$  voi valita luvun 1 ja voittaa. Siis  $\{2, 3, 4, 5\} \subset W_B$ .

Jos  $n_0 = 6$  tai  $7$ , on pelaajan  $A$  valittava häviön välttääkseen joko  $n_1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$  tai  $n_1 = 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ . Tämän jälkeen  $B$ :n on valittava  $n_2 = 6$ . Valitsemalla vuorotellen  $6, 30, 6$ , jne. pelaajat voivat estää toistensa voiton. Siis  $\{6, 7\} = W_T$ .

**90.6.** Todistetaan hiukan yleisempi tulos, jossa 1990 korvataan luvulla  $n$ . Oletetaan, että  $n = prs$ , missä luvut  $p, r$  ja  $s$  ovat ykköstä suurempia eikä niillä ole yhteisiä alkutekijöitä. Jos  $f, g$  ja  $h$  ovat mielivaltaisia kahden kokonaisluvun funktioita, niin pätee

$$\sum_{j=0}^{p-1} \sum_{k=0}^{r-1} \sum_{l=0}^{s-1} e^{\frac{2\pi i}{n}(jrs+kps+lpr)} (f(k, l) + g(l, j) + h(j, k)) = 0. \quad (1)$$

Jos nimittäin erotetaan summasta erilleen se osa, joka sisältää funktion  $f$ , saadaan nolla, sillä  $\sum_{j=0}^{p-1} e^{2\pi i jrs/n} = \sum_{j=0}^{p-1} e^{2\pi i j/p}$ , mikä häviää geometrisen sarjan summan kaavan perusteella. Samoin päätellään, että myös funktion  $g$  ja funktion  $h$  sisältävät summan osat häviävät.

Seuraavaksi havaitaan, että luvut  $jrs + kps + lpr$ , missä  $0 \leq j < p$ ,  $0 \leq k < r$  ja  $0 \leq l < s$  muodostavat täydellisen jäännösluokan modulo  $n$ , sillä niitä on yhteensä  $n$  kappaletta ja mitkään kaksi eivät ole kongruentit keskenään: jos  $j_1rs + k_1ps + l_1pr \equiv j_2rs + k_2ps + l_2pr \pmod{n}$ , niin  $p|(j_1 - j_2)$  jne. Lisäksi luvut  $jrs + ks + l$ , missä  $0 \leq j < p$ ,  $0 \leq k < r$  ja  $0 \leq l < s$ , käyvät läpi täsmälleen luvut  $0, 1, 2, \dots, n-1$ .

Kirjoitetaan binomikaavan avulla  $(jrs + ks + l + 1)^2$  muotoon  $f(j, k) + g(k, l) + h(l, j)$  (näin voidaan tehdä useammallakin tavalla) ja sijoitetaan näin valitut funktion yhtälöön

(1). Edellä tehdyt huomiot takaavat, että

$$\sum_{t=0}^{n-1} e^{2\pi it/n} m_t^2 = 0,$$

missä  $m_0, m_1, m_2, \dots, m_{n-1}$  ovat luvut  $1, 2, \dots, n$  jossain järjestyksessä.

Tulkitaan kompleksiluvut tuttuun tapaan geometrisesti ja muodostetaan murtoviiva, jonka perättäisinä sivuina ovat kompleksiluvut  $m_0^2, m_1^2 e^{2\pi i/n}, m_2^2 e^{2\pi i \cdot 2/n}, \dots, m_{n-1}^2 e^{2\pi i(n-1)/n}$ . Tällöin murtoviivan perättäisten sivujen välinen kulma on sama ja murtoviiva on suljettu. On vielä osoitettava, että murtoviiva sijaitsee toisessa niistä puolitasoista, jotka sen mielivaltainen sivu määrää. Tarkastellaan esimerkiksi sivua  $m_0$ . Voidaan olettaa, että se sijaitsee positiivisella reaaliakselilla. Kompleksiluvuilla  $m_t^2 e^{2\pi it/n}$ ,  $0 < t \leq [n/2]$  on positiivinen imaginaariosa  $m_t^2 \sin(2\pi t/n)$ , joten vastaava monikulmion osa sijaitsee ylemmässä puolitasossa. Jäljelle jäävä osa monikulmiota voidaan ajatella konstruoiduksi niin, että vektorit  $-m_t e^{2\pi it/n}$ ,  $t = n-1, n-2, \dots, [n/2]+1$ , asetetaan tässä järjestyksessä perätysten niin, että ensimmäisen alkupiste on origossa. Kuten edellä, nähdään, että tämäkin osa monikulmiota on ylemmässä puolitasossa. Todistus on vastaava muiden sivujen osalta.

Alkuperäinen tehtävä on tullut ratkaistuksi, sillä  $1990 = 2 \cdot 5 \cdot 199$ .

**91.1.** Olkoon  $a = BC$ ,  $b = CA$  ja  $c = AB$ . Koska kolmion kulman puolittaja jakaa vastaisen sivun viereisten sivujen suhteessa, on

$$\frac{AC'}{C'B} = \frac{b}{a}.$$

Koska  $AC' + C'A = c$ , saadaan

$$AC' = \frac{cb}{a+b}.$$

Koska  $AI$  on kolmion  $ACC'$  kulman  $A$  puolittaja, on vastaavasti

$$\frac{CI}{IC'} = \frac{b}{AC'} = \frac{a+b}{x}.$$

Näin ollen

$$\frac{CI}{CC'} = \frac{CI}{CI + IC'} = \frac{\frac{CI}{IC'}}{\frac{CI}{IC'} + 1} = \frac{a+b}{a+b+c}.$$

Kun lasketaan vastaavat lausekkeet suhteille  $\frac{BI}{BB'}$  ja  $\frac{AI}{AA'}$ , saadaan todistettava epäyhtälö yhtäpitävään muotoon

$$\frac{1}{4} < \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{(a+b+c)^3} \leq \frac{8}{27}.$$

Tämän epäyhtälön oikea puoli seuraa suoraan lukujen  $a + b$ ,  $b + c$  ja  $c + a$  aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon välisestä epäyhtälöstä. Vasemmanpuoleisen epäyhtälön todistamiseksi merkitään

$$x = \frac{a + b - c}{a + b + c}, \quad y = \frac{a - b + c}{a + b + c}, \quad z = \frac{-a + b + c}{a + b + c}.$$

Koska  $a$ ,  $b$  ja  $c$  ovat kolmion sivuja,  $x$ ,  $y$  ja  $z$  ovat positiivisia. Lisäksi  $x + y + z = 1$ . Todistettava epäyhtälö voidaan kirjoittaa muotoon  $2 < (1 + x)(1 + y)(1 + z) = 1 + (x + y + z) + xy + \dots$ , ja se on ilmeisesti tosi.

**91.2.** Olkoon  $\{a_1, a_2, \dots, a_k\} = S$ . Huomataan, että  $a_k = n - 1$ . Jos  $n$  on pariton, niin  $a_1 = 1$  ja  $a_2 = 2$ , jolloin välttämättä  $a_j = j$  kaikilla  $j < n$ . Tämä merkitsee, että  $n$  on alkuluku. Olkoon sitten  $n$  parillinen, mutta ei kakkosen potenssi:  $n = 2^m s$ , missä  $m > 0$  ja  $s \geq 3$ ,  $s$  pariton. Jos  $s \geq 5$ , niin luvut  $s - 4$ ,  $s - 2$ ,  $s + 2$  kuuluvat joukkoon  $S$ , mutta luvut  $s - 3$ ,  $s - 1$ ,  $s$ ,  $s + 1$  ja  $s + 3$  eivät kuulu joukkoon  $S$ . Tämä on vastoin joukosta  $S$  tehtyä oletusta. Ainoa mahdollisuus on  $s = 3$ . Silloin  $n \geq 12$  ja  $S = \{1, 5, 7, 11, \dots, n - 1\}$ , mikä myös on vastoin oletusta. Vain kakkosen potenssit tulevat parillisen  $n$ :n tapauksessa kysymykseen.

**91.3.** Merktään  $A_1$ :llä  $S$ :n parillisten alkioden  $S_2$ :lla  $S$ :n kolmella jaollisten alkioden,  $A_3$ :lla  $S$ :n viidellä jaollisten alkioden ja  $A_4$ :llä  $S$ :n seitsemällä jaollisten alkioden joukkoa. Olkoon  $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4$ . Jos  $|X|$  tarkoittaa joukon  $X$  alkioden lukumäärää, niin  $A = 216$ . Jos joukosta  $A$  valitaan viisi lukua, niin niistä ainakin kaksi kuuluu samaa joukkoon  $A_j$ . Näillä kahdella on yhteinen tekijä. Tehtävän  $n$  on siis ainakin 217.

Olkoon  $B_1 = A \setminus \{2, 3, 5, 7\}$  ja  $B_2 = \{11^2, 11 \cdot 13, 11 \cdot 17, 11 \cdot 19, 11 \cdot 23, 13^2, 13 \cdot 17, 13 \cdot 19\}$  ja  $P = S \setminus (B_1 \cup B_2)$ . Joukon  $P$  alkiot ovat 1 ja  $S$ :n alkuluvut, ja  $|P| = |S| - |B_1| - |B_2| = 280 - 212 - 8 = 60$ . Olkoon nyt  $T \subset S$  joukko, jolle  $|T| \geq 217$ . Osoitetaan, että  $T$  sisältää viisi lukua, joista millään kahdella ei ole muita yhteisiä tekijöitä kuin 1. Voidaan olettaa, että  $|T \cap P| \leq 4$ . Joukossa on  $T$  on siis ainakin 213 yhdistettyä lukua. Koska joukossa  $S$  on 220 yhdistettyä lukua,  $S$ :ssä on enintään seitsemän  $T$ :hen kuulumatonta yhdistettyä lukua. Määritellään kahdeksan joukkoa  $M_i$ ,  $1 \leq i \leq 8$ , seuraavasti:

$$\begin{aligned} M_1 &= \{2 \cdot 23, 3 \cdot 19, 5 \cdot 17, 7 \cdot 13, 11 \cdot 11\} \\ M_2 &= \{2 \cdot 29, 3 \cdot 23, 5 \cdot 19, 7 \cdot 17, 11 \cdot 13\} \\ M_3 &= \{2 \cdot 31, 3 \cdot 29, 5 \cdot 23, 7 \cdot 19, 11 \cdot 17\} \\ M_4 &= \{2 \cdot 37, 3 \cdot 31, 5 \cdot 29, 7 \cdot 23, 11 \cdot 19\} \\ M_5 &= \{2 \cdot 41, 3 \cdot 37, 5 \cdot 31, 7 \cdot 29, 11 \cdot 23\} \\ M_6 &= \{2 \cdot 43, 3 \cdot 41, 5 \cdot 37, 7 \cdot 31, 13 \cdot 17\} \\ M_7 &= \{2 \cdot 47, 3 \cdot 43, 5 \cdot 41, 7 \cdot 37, 13 \cdot 19\} \\ M_8 &= \{2^2, 3^2, 5^2, 7^2, 13^2\} \end{aligned}$$

Välttämättä ainakin yksi joukoista  $M_i$  kuuluu kokonaan  $T$ :hen. Mutta kaikkien  $M_i$ -joukkojen alkiot ovat parittain yhteistekijättömiä. Joukkoa  $T$  koskeva väite on todistettu. Tehtävän  $n$  on siis  $\leq 217$ . Kaikkiaan on oltava  $n = 217$ .

**91.4.** Numeroidaan sivut seuraavasti: aloitetaan jostakin solmusta ja edetään peräkkäisiä vielä numeroimattomia sivuja pitkin varustaen ne ykkösestä alkaen peräkkäisillä numeroilla. Silloin, kun ei ole enää mahdollista jatkaa matkaa pitkin vielä numeroimatonta sivua, siirrytään johonkin solmuun, jonka kautta on jo kuljettu ja josta lähtee vielä numeroimaton sivu, ja toistetaan edellä kuvattu prosessi. Tämä on mahdollista, koska verkko oletettiin yhtenäiseksi. Menettelyä jatketaan, kunnes kaikki sivut on varustettu numeroilla. Jos verkon solmuun liittyy useampia kuin yksi sivu, niin joko solmuun liittyy kaksi sivua, joiden numerot ovat peräkkäiset tai sitten aloitussivu, jonka numero on 1. Kummassakin tapauksessa solmuun liittyvien sivujen numeroiden suurin yhteinen tekijä on 1.

**91.5** Merkitään  $a = BC$ ,  $b = CA$  ja  $c = AB$ ;  $\angle PAB = \alpha'$ ,  $\angle PBC = \beta'$  ja  $\angle PCA = \gamma'$ ;  $a' = PA$ ,  $b' = PB$  ja  $c' = PC$ . Kosinilauseen perusteella

$$\begin{aligned} b'^2 &= a'^2 + c^2 - 2a'c \cos \alpha' \\ c'^2 &= b'^2 + a^2 - 2b'a \cos \beta' \\ a'^2 &= c'^2 + b^2 - 2c'b \cos \gamma', \end{aligned}$$

ja siis

$$2(a'c \cos \alpha' + b'a \cos \beta' + c'b \cos \gamma') = a^2 + b^2 + c^2.$$

Jos olisi  $\alpha' > 30^\circ$ ,  $\beta' > 30^\circ$  ja  $\gamma' > 30^\circ$ , olisi

$$\sqrt{3}(a'c + b'a + c'b) > a^2 + b^2 + c^2. \quad (1)$$

Lasketaan kolmion  $ABC$  ala  $T$  kolmioiden  $PAB$ ,  $PBC$  ja  $PCA$  alojen summana:

$$T = \frac{1}{2}(a'c \sin \alpha' + b'a \sin \beta' + c'b \sin \gamma').$$

Tehdyn oletuksen perusteella

$$T > \frac{1}{4}(a'c + b'a + c'b). \quad (2)$$

Epäyhtälöistä (1) ja (2) seuraa

$$T > \frac{1}{4\sqrt{3}}(a^2 + b^2 + c^2).$$

Mutta Heronin kaavan ja Cauchy – Schwarzin epäyhtälön nojalla on

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)} \\ &\leq \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c) \left( \frac{a+b+c}{3} \right)^3} \\ &= \frac{1}{12\sqrt{3}} (a+b+c)^2 \leq \frac{1}{4\sqrt{3}} (a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

Ristiriita osoittaa vastaoletuksen vääräksi.

**91.6.** Esitetään lukujono, jolle tehtävän epäyhtälö on tosi jo arvolla  $a = 1$ . Koska  $\sqrt{2}$  ei ole rationaaliluku, niin  $|2q^2 - p^2| \geq 1$  kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla  $p$  ja  $q$ . Jos  $p < 2q$ , niin tästä seuraa

$$|q\sqrt{2} - p| \geq \frac{1}{q\sqrt{2} + p} > \frac{1}{4q}. \quad (1)$$

Epäyhtälö (1) pätee luonnollisesti myös, kun  $2q \leq p$ . Asetetaan nyt  $x_i = 4(i\sqrt{2} - [i\sqrt{2}])$ . Silloin  $|x_i| < 4$  kaikilla  $i$ , ja kun  $i > j$  on

$$|i - j||x_i - x_j| = 4(i - j)|i\sqrt{2} - ([i\sqrt{2}] - [j\sqrt{2}])| > \frac{4(i - j)}{4(i - j)} = 1.$$

**92.1.** Oletetaan, että  $(a - 1)(b - 1)(c - 1) | abc - 1$ . Jos jokin luvuista  $a, b, c$  on pariton, on luvulla  $abc - 1$  parillinen tekijä  $(a - 1)(b - 1)(c - 1)$ . Tämä on mahdollista vain, jos  $a, b$  ja  $c$  ovat kaikki parittomia. Siispä luvut  $a, b$  ja  $c$  ovat yhtä aikaa kaikki parillisia tai kaikki parittomia. Mikäli olisi  $a \geq 4$ , voitaisiin arvioida

$$\frac{abc - 1}{(a - 1)(b - 1)(c - 1)} < \frac{a}{a - 1} \frac{b}{b - 1} \frac{c}{c - 1} \leq \frac{4}{3} \frac{5}{4} \frac{6}{5} = 2,$$

mikä on mahdotonta. Jos  $a = 2$ , niin  $b \geq 4$  ja  $c \geq 6$  ovat parillisia ja luku  $(b - 1)(c - 1)$  itseään suuremman ja parittoman luvun  $2bc - 1$  tekijä. Arvion  $5 \cdot (b - 1)(c - 1) = 2bc + 5 + c(2b - 5) + b(c - 5) > 2bc - 1$  nojalla ainoaksi vaihtoehdoksi jää  $2bc - 1 = 3(b - 1)(c - 1)$  eli  $(b - 3)(c - 3) = 5$ . Koska 5 on alkuluku, on oltava  $b - 3 = 1$  ja  $c - 3 = 5$ . Löydettiin ratkaisu  $(a, b, c) = (2, 4, 8)$ . Jos  $a = 3$ ,  $b \geq 5$  ja  $c \geq 7$  ovat parittomia, ja  $2(b - 1)(c - 1)$  on tekijänä itseään suuremmassa luvussa  $3bc - 1$ . Koska  $3 \cdot 2(b - 1)(c - 1) = 3bc + 6 + (2b - 6)c + (c - 6)b > 3bc - 1$ , niin  $3bc - 1 = 2 \cdot 2(b - 1)(c - 1)$  eli  $(b - 4)(c - 4) = 11$ , josta seuraa  $b = 5$  ja  $c = 15$ . Tehtävällä on ratkaisut  $(a, b, c) = (2, 4, 8)$  ja  $(a, b, c) = (3, 5, 15)$ .

**92.2.** Merkitään  $f(0) = a$  ja  $f(-a^2) = b$ . Annetun funktionaaliyhtälön nojalla  $f(b) = f(0^2 + f(-a^2)) = -a^2 + a^2 = 0$ . Jos  $f(x) = 0$ , niin  $a = f(0) = f(0^2 + f(x)) = x + a^2$ , joten  $x = a - a^2$ . Siis  $b$  on funktion  $f$  ainoa nollakohta, ja  $b = a - a^2$ . Toisaalta  $f(b^2 + a) = f(b^2 + f(0)) = 0$ , joten on oltava  $b^2 + a = a - a^2$ , eli  $a^2 + b^2 = 0$ . Näin on osoitettu, että  $a = f(0) = 0$ .

Kun funktionaaliyhtälöön sijoitetaan  $y$ :n paikalle  $f(y)$  ja  $x = 0$  nähdään, että

$$f(f(y)) = y. \quad (1)$$

Sijoittamalla  $y = 0$  saadaan

$$f(x^2) = (f(x))^2. \quad (2)$$

Viimeksi johdetun yhtälön nojalla  $f(x) \geq 0$ , kun  $x \geq 0$ . Koska 0 on ainoa nollakohta, niin

$$f(x) > 0, \quad \text{kun } x > 0.$$

Sijoittamalla funktionaaliyhtälöön  $y$ :n paikalle  $f(y)$  ja soveltamalla yhtälöitä (1) ja (2) nähdään, että itse asiassa

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \text{kun } x \geq 0 \text{ ja } y \in \mathbf{R}. \quad (3)$$

Oletetaan, että  $x > y$ . Silloin yhtälön (3) nojalla  $f(x) = f(x-y) + f(y) > f(y)$ , eli funktio  $f$  on aidosti kasvava. Jos jollakin  $x \in \mathbf{R}$  olisi  $x > f(x)$ , niin seuraisi  $f(x) > f(f(x))$ , ja yhtälön (1) nojalla  $f(x) > x$ , mikä on mahdotonta. Vastaavasti johdetaan ristiriita lähtien oletuksesta  $x < f(x)$ . Ainoaksi mahdollisuudeksi jää, että  $f(x) = x$  kaikilla  $x$ . Kääntäen huomataan, että identtinen funktio toteuttaa selvästi annetun funktionaaliyhtälön.

**92.3.** Osoitetaan, että  $n = 33$ . Selvästikin pisteiden yhdysjanoja on kaikkiaan 36. Mikäli 33 yhdysjanaa on väritetty, voidaan valita kolme pistettä niin, että jokainen värittämätön yhdysjana päättyy johonkin näistä pisteistä. Merkitään jäljelle jääneitä pisteitä  $A_1, A_2, \dots, A_6$ ; jokainen näiden välisistä yhdysjanoista on väritetty. Tarkastellaan seuraavaksi vain näiden pisteiden välisiä janoja. Pisteestä  $A_1$  lähtee ainakin kolme samanväristä janaa; symmetrian nojalla voidaan olettaa, että esim. janat  $A_1A_2, A_1A_3$  ja  $A_1A_4$  ovat punaisia. Jos nyt janoista  $A_2A_3, A_2A_4, A_3A_4$  on jokin punainen, niin selvästi muodostuu punainen kolmio, jonka kärkenä on  $A_1$ . Jos taas viimeksi mainitut janat ovat kaikki vihreitä, on kolmio  $A_2A_3A_4$  yksivärinen. [Itse asiassa tässä todistettiin tunnettu kombinatoriikan tulos, joka usein ilmaistaan muodossa: kuuden henkilön joukosta voidaan valita kolme, jotka ovat joko kaikki toistensa tuttuja tai kaikki tuntemattomia toisilleen!] Näin on tullut osoitetuksi, että  $n \leq 33$ .

Todistus on valmis, kun konstruoidaan 32 yhdysjanan väritys siten ettei yksiväristä kolmiota muodostu. Merkitään annettuja pisteitä numeroilla 1, 2, ..., 9. Väritetään punaisiksi yhdysjanat 12, 13, 19, 18, 24, 25, 34, 35, 46, 47, 56, 57, 68, 69, 78, 79; jätetään värittämättä yhdysjanat 23, 45, 67, 89 ja väritetään loput janoista vihreiksi. Tarkistus on mekaaninen.

**K92.4.** Sivutkoon ympyrä  $C$  suoraa  $L$  pisteessä  $P_1$ , olkoon  $O$  ympyrän  $C$  keskipiste ja  $P_2$  ympyrällä  $C$  siten, että  $P_1P_2$  on ympyrän halkaisija. Olkoon  $S$  puolisuora, joka alkaa pisteestä  $P_2$ , on janan  $OM$  suuntainen ja sijaitsee ympyrän  $C$  ulkopuolella. Todistetaan, että kysytty pistejoukko muodostuu puolisuorasta  $S$  (johon ei lueta pistettä  $P_2$ ). Riittää, kun osoitetaan, että mikäli pisteet  $PQR$  ovat kuten tehtävässä, niin janat  $PP_2$  ja  $OM$  ovat yhdensuuntaisia. Merkitään  $|PQ| = c, |QR| = a$  ja  $|RP| = b$ . Olkoon  $C'$  ympyrä kolmion  $PQR$  ulkopuolella, joka sivuaa sivua  $QR$  ja sivujen  $PQ$  ja  $PR$  jatkeita. Leikatkoon suora  $PP_2$  suoran  $L$  pisteessä  $P_3$ . Käyttämällä hyväksi homotetiaa pisteen  $P$  suhteen, joka vie ympyrän  $C$  ympyrälle  $C'$ , nähdään, että  $C'$  sivuaa suoraa  $L$  pisteessä  $P_3$ . Merkitään  $|QP_3| = x$  ja  $|RP_3| = y$ . Tarkastelemalla pisteestä  $Q$  ympyrälle  $C'$  piirrettyjä tangentteja nähdään, että pisteestä  $P$  ympyrälle  $C'$  piirretyn tangentin pituus on  $c + x$ . Vastaavasti kyseiseksi pituudeksi lasketaan  $b + y$ , joten  $x - y = b - c$ . Toisaalta  $x + y = a$ , joten  $x = (a + b - c)/2$ . Sivutkoon ympyrä  $C$  sivuja  $PQ$  ja  $PR$  pisteissä  $R_1$  ja  $Q_2$ . Merkitään  $|PR_1| = u, |QP_1| = v$  ja  $|RQ_1| = w$ . Koska  $|QR_1| = |QP_1|$ , niin  $u + v = c$  ja vastaavasti  $v + w = a, w + u = b$ , joten  $|RP_1| = |RQ_1| = w = (a + b - c)/2 = |QP_3|$ . Koska  $M$  puolittaa sivun  $QR$ , niin edellisen nojalla se puolittaa myös janan  $P_1P_3$ . Siispä kolmiot  $P_2P_1P_3$  ja  $OP_1M$  ovat yhdenmuotoisia, mistä seuraakin janojen  $PP_2$  ja  $OM$  yhdensuuntaisuus.

**92.5.** Merkitään  $|S_x| = a, |S_y| = b$  ja  $|S_z| = c$ . Todistetaan väite induktiolla lukumäärän  $|S|$  suhteen. Väite pätee selvästi kun  $|S| = 1$ . Oletetaan sitten, että väite on tosi kun  $|S| < N, N \geq 2$ . Tarkastellaan joukkoa  $S$ , jolle  $|S| = N$ . Voidaan valita taso  $T$ , joka on yhdensuuntainen jonkin koordinaattitason kanssa, ja joka jakaa joukon  $S$  kahdeksi

osajoukoksi  $S_1$  ja  $S_2$  siten, että  $N = |S_1| + |S_2|$  ja  $|S_1| < N$ ,  $|S_2| < N$ . Induktiohypoteesin nojalla  $|S_1|^2 \leq a_1 b_1 c_1$  ja  $|S_2|^2 \leq a_2 b_2 c_2$ , missä  $a_1 = |(S_1)_x|, \dots, c_2 = |(S_2)_z|$ . Voidaan olettaa, että taso  $T$  on yhdensuuntainen  $xy$ -tason kanssa, jolloin  $a_1 + a_2 = a$ ,  $b_1 + b_2 = b$ ,  $c_1 \leq c$  ja  $c_2 \leq c$ . Induktioaskel on valmis, kun havaitaan, että Cauchyn – Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} |S|^2 &= (|S_1| + |S_2|)^2 \leq (\sqrt{a_1 b_1 c_1} + \sqrt{a_2 b_2 c_2})^2 \\ &\leq c(\sqrt{a_1} \sqrt{b_1} + \sqrt{a_2} \sqrt{b_2})^2 \leq c(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = abc. \end{aligned}$$

**92.6.** Sovitaan, että ratkaisussa käytettävät kirjainsymbolit edustavat aina kokonaislukuja. Sanotaan, että luonnollisella luvulla  $m$  on  $k$ -esitys ( $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$ ), mikäli  $m$  voidaan lausua  $k$ :n positiivisen neliöluvun summana.

(a) Riittää, kun osoitetaan, ettei millään luvulla  $m \geq 16$  ole  $(m - 13)$ -esitystä. Vastaotuksen mukaan voitaisiin kirjoittaa  $m = a_1 + 4a_2 + 9a_3 + \dots + r^2 a_r + \dots$  ja  $m - 13 = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$ , missä  $a_i \geq 0$ . Vähentämällä yhtälöt toisistaan saadaan  $13 = 3a_2 + 8a_3 + 15a_4 + \dots$ , mistä seuraa  $a_i = 0$ , kun  $i \geq 3$ , ja  $3a_2 + 8a_3 = 13$ . Suora kokeilu osoittaa, ettei viimeksi kirjoitettu yhtälö toteudu positiivisilla luvuilla  $a_2$  ja  $a_3$ .

(b) Todistetaan, että  $S(13) = 13^2 - 14$ . Osoitetaan ensin, että luvulla  $13^2 = 169$  on  $k$ -esitys, joka koostuu vain neliöistä 1, 4 ja 9, kun  $25 \leq k \leq 155 = 13^2 - 14$ . On ratkaistava kokonaislukuyhtälöt

$$a_1 + 4a_2 + 9a_3 = 169 \quad (1)$$

ja

$$a_1 + a_2 + a_3 = k \quad (2)$$

( $a_i \geq 0$ ). Kun  $a_1$  eliminoidaan pois, on yhtäpitävästi ratkaistava  $3a_2 + 8a_3 = 169 - k$  rajoituksella  $a_2 + a_3 \leq k$ . Koska  $2 \cdot 3 + 8 = 14$ ,  $5 \cdot 3 = 15$ ,  $2 \cdot 8 = 16$  ja  $169 - k \geq 14$ , niin voidaan kirjoittaa  $169 - k = 3 \cdot \ell + m$ , missä  $\ell \geq 0$  ja  $m \in \{14, 15, 16\}$ . Siis löytyy ei-negatiiviset  $r, s$  niin, että  $169 - k = 3r + 8s$ . Mikäli  $r \leq 7$ , valitaan  $a_2 = r$ ,  $a_3 = s$ . Muussa tapauksessa kirjoitetaan  $r = 8u + v$ , missä  $0 \leq v \leq 7$ , ja valitaan  $a_2 = v$ ,  $a_3 = s + 3u$ . Näin on löydetty ei-negatiiviset  $a_2, a_3$ , joille  $169 - k = 3a_2 + 8a_3$  ja  $a_2 \leq 7$ . Lisäksi  $a_2 + a_3 \leq 7 + (169 - k)/8 \leq k$ , kun  $k \geq 25$ . Valitaan  $a_1 = k - a_2 - a_3 \geq 0$ , jolloin kolmikko  $(a_1, a_2, a_3)$  toteuttaa yhtälöt (1) ja (2).

Kirjoitetaan lopuksi  $k$ -esitykset luvulle 169  $k$ :n arvoilla 1, 2, ..., 24:  $169 = 144 + 25 = 144 + 16 + 9 = 100 + 64 + 4 + 1 = 2 \cdot 64 + 36 + 4 + 1 = 144 + 9 + 4 \cdot 4 = 64 + 4 \cdot 25 + 4 + 1 = 64 + 36 + 4 \cdot 16 + 4 + 1 = 4 \cdot 36 + 9 + 4 \cdot 4 = 4 \cdot 25 + 4 \cdot 16 + 4 + 1 = 36 + 8 \cdot 16 + 4 + 1 = 3 \cdot 36 + 5 \cdot 9 + 4 \cdot 4 = 4 \cdot 25 + 3 \cdot 16 + 5 \cdot 4 + 1 = 8 \cdot 16 + 4 \cdot 9 + 4 + 1 = 2 \cdot 36 + 9 \cdot 9 + 4 \cdot 4 = 4 \cdot 25 + 2 \cdot 16 + 9 \cdot 4 + 1 = 7 \cdot 16 + 4 \cdot 9 + 5 \cdot 4 + 1 = 36 + 13 \cdot 9 + 4 \cdot 4 = 4 \cdot 25 + 16 + 13 \cdot 4 + 1 = 6 \cdot 16 + 4 \cdot 9 + 9 \cdot 4 + 1 = 17 \cdot 9 + 4 \cdot 4 = 4 \cdot 25 + 17 \cdot 4 + 1 = 5 \cdot 16 + 4 \cdot 9 + 13 \cdot 4 + 1 = 17 \cdot 9 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 1$ .

(c) Väite seuraa b-kohdasta kun todistetaan, että tiedosta  $S(X) = X^2 - 14$  seuraa  $S(2X) = (2X)^2 - 14$ , kun  $X \geq 8$ . Oletetaan siis, että  $S(X) = X^2 - 14$  ja  $X \geq 8$ . Luvulle  $(2X)^2$  saadaan  $k$ -esitykset kun  $k = 1, 2, 3$  yksinkertaisesti kirjoittamalla luvulle  $X^2$  vastaavat esitykset ja kertomalla puolittain luvulla 4. Toisaalta  $(2X)^2 = X^2 + X^2 + X^2 + X^2$  ja kun tässä oikealla puolella kirjoitetaan  $i$ :nnelle summattavalle riippumattomasti  $r_i$ -esitykset



mahdollisilla  $r_i$ :n arvoilla saadaan luvulle  $(2X)^2$   $k$ -esitykset kun  $4 \leq k \leq (2X)^2 - 56$ . Olkoon vihdoin  $k = (2X)^2 - r$ , missä  $14 \leq r \leq 55$ . Koska  $X^2 \geq 8$ , on oletuksen mukaan luvulla  $X^2$   $(X^2 - r)$ -esitys  $X^2 = a_1^2 + \dots + a_{X^2 - r}^2$ . Luvulle  $(2X)^2$  saadaan  $k$ -esitys muodossa  $(2X)^2 = a_1^2 + \dots + a_{X^2 - r}^2 + (3X^2) \cdot 1^2$ .

**93.1.** Oletetaan, että  $f(x) = g(x)h(x)$ , missä  $g$  ja  $h$  ovat kokonaislukukertoimisia ainakin ensimmäistä astetta olevia polynomeja. Silloin  $g(0)h(0) = 3$ , joten  $g(0)$ :n ja  $h(0)$ :n mahdolliset arvot ovat  $\pm 1$  ja  $\pm 3$ . Oletetaan, että  $g(0) = \pm 1$ . Voidaan olettaa, että  $g(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x \pm 1$ . Koska  $f(\pm 1) \neq 0$ , niin  $k > 1$ . Olkoot  $x_1, x_2, \dots, x_k$  yhtälön  $g(x) = 0$  (kompleksiset) ratkaisut. Silloin  $|x_1x_2 \dots x_k| = 1$ . Koska luvut  $x_j$  ovat yhtälön  $f(x) = 0$  ratkaisuja, niin  $x_j^{n-1}(x_j + 5) = -3$ ,  $j = 1, 2, \dots, k$ . Kun nämä  $k$  yhtälöä kerrotaan keskenään, saadaan  $|(x_1 + 5)(x_2 + 5) \dots (x_k + 5)| = 3^k$  eli  $|g(-5)| = 3^k$ . Toisaalta  $g(-5)$  on luvun  $f(-5) = 3$  tekijä, joten  $|g(-5)| = 1$  tai  $|g(-5)| = 3$ . Saatu ristiriita osoittaa ratkaisun alussa tehdyn oletuksen virheelliseksi, joten tehtävän väite on tullut todistetuksi.

**93.2.** (a) Piirretään jana  $DE$  niin, että  $DE = DB$  ja  $DE \perp DB$ . Silloin  $\angle ADE = \angle ACB$  ja  $\frac{AD}{AC} = \frac{BD}{BC} = \frac{DE}{BC}$ , joten kolmiot  $ADE$  ja  $ACB$  ovat yhdenmuotoiset (sks). Täten  $\angle CAB = \angle DAE$  ja  $\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD}$ . Edelleen  $\angle CAD = \angle CAB - \angle DAB = \angle DAE - \angle DAB = \angle BAE$ . Myös kolmiot  $CAD$  ja  $BAE$  ovat yhdenmuotoiset (sks). Koska  $BDE$  on tasakylkinen suorakulmainen kolmio,  $BE = \sqrt{2}BD$ . Saadaan siis  $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BE} = \frac{CD}{\sqrt{2}BD}$ , josta  $\frac{AB \cdot CD}{AC \cdot BD} = \sqrt{2}$ .

(b) Olkoot  $CT$  ja  $CU$  kolmioiden  $ACD$  ja  $BCD$  ympäri piirrettyjen ympyröiden pisteeseen  $C$  piirrettyjä tangentteja. Silloin  $\angle DCT = \angle DAC$  ja  $\angle DCU = \angle DBC$  samoja kaaria vastaavina tangentti- ja kehäkulmina. Kolmion  $ABD$  kulmasummasta saadaan  $\angle ADE + \angle DAB + \angle DBA + 90^\circ = 180^\circ$ . Koska  $\angle ADE = \angle ACB$ , on edelleen  $\angle ACB + \angle CAB - \angle CAD + \angle ABC - \angle DBC = 90^\circ$ . Kun otetaan huomioon kolmion  $ABC$  kulmasumma, saadaan haluttu relaatio  $90^\circ = \angle CAD + \angle DBC = \angle DCU + \angle DCT = \angle UCT$ .

**93.3.** Väritetään šakkilaudan ruudut kolmella värillä  $A$ ,  $B$  ja  $C$  niin, että kussakin ”alhaalta vasemmalta” ”ylös oikealle” kulkevassa vinorivissä ruudut ovat samanväriset ja vinorivien värit seuraavat toisiaan samassa järjestyksessä. Oletetaan, että nappuloiden alkuasentoneliön lävistäjärivi on väriä  $A$ . Symmetrian perusteella  $B$ - ja  $C$ -värisillä ruuduilla on alkuasemassa yhtä monta nappulaa. Jos  $n = 3k$ , niin  $A$ -värisillä ruuduilla on alkuasemassa

$$3k + 2((3k - 3) + (3k - 6) + \dots + 3) = 3k + 2 \cdot 3 \frac{k(k-1)}{2} = 3k^2 = \frac{1}{3}n^2$$

nappulaa; alkuasemassa on tällöin yhtä monta nappulaa jokaisella kolmella värillä väritetyissä ruuduissa. Jokainen pelin siirto muuttaa kunkin värisillä ruuduilla olevien nappuloiden määrän parillisuuden: siirto poistaa kahdelta eriväriseltä ruudulta nappulan ja lisää yhden nappulan kolmannelle värille. Loppuasemassa yhden värin nappulamäärä on

pariton ja kahden muun parillinen. Koska alkuasemassa kaikilla väreillä oli sama nappulamäärä, peli ei voi onnistua.

Olkoon sitten  $n$  jaoton kolmella. Jos  $n = 2$ , peli saadaan onnistumaan. Helposti nähdään myös, että neljästä ruudusta muodostuvan  $L$ :n muotoisen kuvion kolmesta vierekkäin olevasta ruudusta voidaan kolmella siirrolla poistaa nappulat, jos  $L$ :n lyhyemmässä sakarassa olevalla nappulalla voidaan tehdä ensimmäinen siirto. Lisäksi  $2 \times 3$ -suorakaiteessa olevat kolme kuusi nappulaa voidaan poistaa esimerkiksi silloin, kun suorakaiteen kahdella pitkän ja yhden lyhyen sivun vierekkäiset ruudut ovat tyhjiä ja ainakin toinen toiseen lyhyeen sivuun rajoittuvista ruuduista on miehitetty. Näitä operaatioita toistamalla nähdään, että peli onnistuu, kun  $n = 4$  ja  $n = 5$ . Kun  $n > 6$ , samoja operaatioita toistamalla päästään tilanteeseen, jossa nappulat ovat  $(n - 3) \times (n - 3)$ -neliössä. Toistamalla tarvittaessa samat operaatiot saadaan tilanne palautetuksi  $4 \times 4$ - tai  $5 \times 5$ -neliöön. Peli onnistuu siis aina ja vain, kun  $n$  ei ole jaollinen kolmella.

**93.4.** Olkoot  $A_1$  ja  $A_2$  mielivaltaisia tason pisteitä ja  $r < A_1A_2$ . Selvitetään ensin, millainen on niiden pisteiden  $X$  joukko  $E(A_1, A_2, r)$ , joille pätee  $m(XA_1A_2) \leq r$ . Jos  $K_1$  ja  $K_2$  ovat  $A_1$ - ja  $A_2$ -keskiset  $r$ -säteiset ympyrät  $t_1$  ja  $t_2$  ympyröiden  $K_1$  ja  $K_2$  yhdensuuntaiset yhteiset tangentit ja  $t'_1, t''_1$  sekä  $t'_2, t''_2$  ympyrän  $K_1$  kautta kulkevat ympyrän  $K_2$  sekä pisteen  $A_2$  kautta kulkevat ympyrän  $K_1$  tangentit, niin kyseinen joukko muodostuu suorien  $t_1$  ja  $t_2$  väliin jäävästä yhdensuuntaisvyöstä ja kulmista  $t'_1A_1t''_2$  sekä  $t'_2A_2t''_1$ . Jos  $M_1$  on tangenttien  $t_1$  ja  $t'_1$  leikkauspiste, niin helppo kehäkulmatarkastelu osoittaa, että kolmio  $A_1A_2M_1$  on tasakylkinen, eli  $A_1M_1 = A_1A_2$ . Joukkoa  $E(r)$  rajoittavien murtoviivojen kärkipisteet ovat siis  $A_1A_2$ :sta etäisyydellä  $r$  olevilla suorilla ja  $A_1$ - sekä  $A_2$ -keskisillä  $A_1A_2$ -säteisillä ympyröillä.

Olkoon sitten  $ABC$  tehtävän kolmio; ei merkitse rajoitusta, kun oletetaan, että  $AB$  on sen pisin sivu; merkitään  $r = m(ABC)$ . Suorat  $AB$ ,  $BC$  ja  $CD$  jakavat tason seitsemään osaan, joista yksi on kolmio  $G_{ABC}$  eli kolmio  $ABC$ , ja kolme sellaisia kulmia, joiden kärki on jokin kolmion kärki. Olkoot nämä alueet  $G_A$ ,  $G_B$  ja  $G_C$ . Loput kolme aluetta ovat kahden puolisäteen ja yhden kolmion sivun rajoittamia alueita; olkoot ne  $G_{AB}$ ,  $G_{BC}$  ja  $G_{AC}$ . Kukin alue sisältää myös reunansa. Jaetaan tarkastelu tapauksiin sen mukaan, missä piste  $X$  sijaitsee. (a) Piste  $X$  on kolmion  $ABC$  sisällä (tai reunalla). Jos  $|PQR|$  on kolmion  $PQR$  ala ja  $-PQ-$  janan  $PQ$  pituus, niin  $|ABC| = |ABX| + |AXC| + |ABC|$ . Jaetaan tämä yhtälö puolittain  $|AB|$ :llä. Koska  $|AB| \geq |AX|$ ,  $|AB| \geq |BX|$ , niin

$$m(ABC) \leq m(ABX) + \frac{2|AXC|}{|AB|} + \frac{2|XBC|}{|AB|}. \quad (1)$$

Selvästi  $2|PQR| = m(PQR) \cdot \max\{|PQ|, |QR|, |RP|\}$ . Koska  $AB$  on ainakin yhtä pitkä kuin kolmioiden  $AXC$  ja  $XBC$  pisin sivu, niin epäyhtälön (1) oikean puolen kaksi viimeistä yhteenlaskettavaa ovat enintään  $m(AXC)$  ja  $m(XBC)$ . Väite on tässä tapauksessa todistettu. (b) Piste  $X$  on alueessa  $G_C$ . Koska  $m(ABC) = r$  on pisteestä  $C$  piirretyn korkeusjanan pituus, ja  $|AC| \leq |AB|$ ,  $|BC| \leq |AB|$ , niin piste  $C$  ja alue  $G_C$  on joukon  $E(A, B, r)$  osajoukko. (c) Piste  $X$  on joukossa  $G_A$ . Koska suora  $AB$  on  $C$ -keskisen  $r$ -säteisen ympyrän tangentti, kulma  $G_A$  on joukon  $E(B, C, r)$  osajoukko, joten  $m(ABC) = r \leq m(XBC)$ . Väite pätee; symmetrian takia väite pätee myös, kun  $X \in G_B$ . (d) Piste  $X$  on alueessa  $G_{AB}$ . Leikatkaa  $XC$  janan  $AB$  pisteessä  $Y$ . Kohtien (b) ja (c) perusteella

$m(AYC) \leq m(AXC)$  ja  $m(BCY) \leq m(BCX)$ . Lisäksi  $m(ABY) = 0$ . Koska  $y \in G_{ABC}$ ,  $m(ABC) \leq m(ABY) + m(AYC) + m(YBC) \leq m(ABX) + m(AXC) + m(XBC)$ . Päätelytapauksissa  $X \in G_{BC}$  ja  $X \in G_{AC}$  on sama.

**93.5.** Olkoon  $r = \frac{1}{2}(\sqrt{5} + 1)$ ,  $1,6 < r < 1,7$ , yhtälön  $r^2 = r + 1$  positiivinen juuri. Silloin funktiolle  $g(x) = rx$  pätee kaikilla  $n \in \mathbb{N}$   $g(g(n)) = r^2n = rn + n = g(n) + n$ .  $g(n)$  ei kuitenkaan ole kokonaisluku. Asetetaan  $f(n) = \left\lceil g(n) + \frac{1}{2} \right\rceil$ . Silloin  $f(1) = \left\lceil r + \frac{1}{2} \right\rceil = 2$ . Koska  $r > 1$ , niin  $g(n+1) > g(n) + 1$ , mistä seuraa, että myös  $f(n+1) > f(n)$ . On vielä osoitettava, että  $f$  toteuttaa tehtävän keskimmäisen ehdon. Tämä seuraa siitä, että  $f(f(n)) - f(n) - n$  on kokonaisluku,  $|g(n) - f(n)| < \frac{1}{2}$  ja

$$\begin{aligned} |f(f(n)) - f(n) - n| &= |g(g(n)) - g(n) - n - g(g(n)) + f(f(n)) - f(n) + g(n)| \\ &= |f(f(n)) - g(g(n)) + g(n) - f(n)| \\ &= |g(f(n)) - g(g(n)) + f(f(n)) - g(f(n)) + g(n) - f(n)| \\ &= |(1-r)(g(n) - f(n) + f(f(n)) - g(f(n)))| \leq \frac{1}{2}(r-1) + \frac{1}{2} = \frac{r}{2} < 1. \end{aligned}$$

**93.6.** Ajatellaan lamppuja kierrettävän  $n$ :ssä paikassa  $T_0, T_1, \dots$ , jne. niin, että operaatiota  $S_j$  tehtäessä lamppu  $L_j$  on paikassa  $T_0$ . Olkoon  $v_j$  0 tai 1 sen mukaan, onko paikassa  $T_j$  sammuksissa oleva vai palava lamppu. Operaatio  $S_j$  merkitsee, että  $v_0$  korvataan luvulla  $v_0 + v_{n-1} \pmod{2}$  ja kierto sitä, että  $v_j$ :n tilalle tulee  $v_{j+1}$ . Liitetään lamppujen tilaan kullakin hetkellä polynomi

$$P(x) = v_{n-2} + v_{n-3}x + \dots + v_0x^{n-2} + v_{n-1}x^{n-1}.$$

Operaatio ja kierto merkitsevät, että polynomi muuttuu muotoon

$$Q(x) = v_{n-1} + v_{n-2}x + \dots + (v_0 + v_{n-1})x^{n-1}.$$

Jos käytetään polynomikongruenssimerkintää  $p(x) \equiv q(x) \pmod{r(x)}$ , jos  $p(x) - q(x)$  on polynomin  $r$  monikerta ja lasketaan kertoimilla modulo 2, niin operaatio ja kierto merkitsevät, että  $Q(x) \equiv xP(x) \pmod{x^n + x^{n-1} + 1}$ . Käytetään tämän jälkeen  $\equiv$ -merkkiä tarkoittamaan polynomikongruenssia  $\pmod{x^n + x^{n-1} + 1}$ . (a)-kohdan todistamiseksi riittää löytää  $M(n)$  siten, että  $x^{M(n)} \equiv 1$ . Koska tarkasteltavan kongruenssin ekvivalenssiluokkien määrä on äärellinen, on oltava  $x^q \equiv x^r$  joillakin kokonaisluvuilla  $q < r$ . Mutta silloin  $x^{r-q} \equiv 1$ . (b)-kohta tulee todistetuksi, jos osoitetaan, että  $x^{n^2-1} \equiv 1$ , kun  $n = 2^k$ . Nyt

$$x^{n^2} \equiv (x^{n-1} + 1)^n \equiv x^{n^2-n} + 1,$$

koska kertalukua  $n = 2^k$  olevat binomikertoimet ovat ensimmäistä ja viimeistä lukuun ottamatta parillisia. Siten

$$1 \equiv (1 + x^n)x^{n^2-n} \equiv x^{n^2-1}.$$

(c)-kohdassa osoitetaan vastaavasti, että  $x^{n^2-n+1} \equiv 1$ , kun  $n = 2^k + 1$ . Samalla tavalla kuin (b)-kohdassa saadaan

$$x^{n^2-1} \equiv (x^{n+1})^{n-1} \equiv (x + x^n)^{n-1} \equiv x^{n-1} + x^{n(n-1)}$$

ja

$$(1 + x^{n-1})x^{n^2-n} \equiv x^{n-1},$$

josta väite seuraa, kun sijoitetaan  $1 + x^{n-1} \equiv x^n$ .

**94.1.** Merkitään  $A = \{a_1, \dots, a_m\}$  ja  $h = \min A$ . Koska  $a_i$ :t eroavat toisistaan, on siis todistettava, että joukon  $A$  alkioiden keskiarvo on vähintään  $\frac{n+1}{2}$ . Tutkitaan joukon  $A$  alkioita modulo  $h$ , ja merkitään  $A_k = \{a \in A \mid a \equiv k \pmod{h}\}$  kaikilla  $k = 0, \dots, h-1$ . Olkoon  $k \in \{0, \dots, h-1\}$  sellainen, että  $A_k \neq \emptyset$ . Tällöin  $h_k = \min A_k \geq h$ . Koska  $h_k \in A$  ja  $h \in A$ ,  $h_k + jh \in A$  kaikilla  $j = 0, \dots, j_k$ , missä  $j_k$  on suurin kokonaisluku  $j$ , jolle pätee  $h_k + jh \leq n$ . Luvun  $j_k$  määritelmästä seuraa välittömästi, että  $h_k + (j_k + 1)h > n$  eli  $h_k + j_k h \geq n - h + 1$ . Nyt joukon  $A_k = \{h_k, h_k + h, \dots, h_k + j_k h\}$  alkioit muodostavat aritmeettisen jonon, ja sen alkioiden keskiarvo on

$$\frac{h_k + (h_k + j_k h)}{2} \geq \frac{h + n - h + 1}{2} = \frac{n + 1}{2}.$$

Koska kaikilla  $k = 0, \dots, h-1$  joko  $A_k = \emptyset$  tai joukon  $A_k$  alkioiden keskiarvo on vähintään  $\frac{n+1}{2}$ , myös joukon  $A$  alkioiden keskiarvo on vähintään  $\frac{n+1}{2}$ .

**94.2.** Oletetaan ensin, että  $OQ$  ja  $EF$  ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tällöin suorakulmaisilla kolmioilla  $OQE$  ja  $OBE$  on sama hypotenuusa, joten ympyrä, jonka halkaisijana on  $OE$ , kulkee pisteiden  $O, Q, B$  ja  $E$  kautta. Samasta syystä nelikulmion  $OCFQ$  ympäri voidaan piirtää ympyrä. Tarkastelemalla näiden ympyröiden kehäkulmia todetaan, että  $\angle OEQ = \angle OBQ$  ja  $\angle OFQ = \angle OCQ$ . Toisaalta kolmion  $OCB$  tasakylkisyyden vuoksi  $\angle OBQ = \angle OCQ$ . Siis kolmiot  $OQE$  ja  $OQF$  ovat yhtenevät, mistä seuraa  $QE = QF$ .

Oletetaan sitten, että  $QE = QF$ . Leikatkaa kolmion  $OEF$  kantaa  $EF$  vasten piirretty korkeusjana (tai sen jatke) suoran  $BC$  pisteessä  $Q'$ .

Piirretään pisteen  $Q'$  kautta janan  $EF$  kanssa yhdensuuntainen suora; tämä leikkaa suorat  $AB$  ja  $AC$  pisteissä  $E'$  ja  $F'$ . Yllä todistetun perusteella  $Q'E' = Q'F'$ . Leikatkaa  $AQ'$  janan  $EF$  pisteessä  $N$ . Yhdenmuotoisuuksien nojalla  $NE = NF$ , ja koska oletettiin, että  $QE = QF$ , täytyy olla  $Q = N$ . Toisaalta  $Q$  on suoralla  $BC$ ,  $N$  suoralla  $AQ'$ , ja  $Q'$  on näiden suorien yksikäsitteinen leikkauspiste. Siis  $Q = Q'$  ja  $OQ$  ja  $EF$  ovat kohtisuorassa.

**94.3.** a) Määritellään luonnollisten lukujen joukossa funktio  $\phi$  asettamalla  $\phi(k) = 1$ , jos luvun  $k$  binäärikehityksessä on kolme ykköstä ja  $\phi(k) = 0$  muuten. Ilmeisestikin  $f(k+1) = f(k) - \phi(k+1) + \phi(2k+1) + \phi(2k+2)$ . Toisaalta lukujen  $k+1$  ja  $2(k+1)$  binääriesityksissä on sama määrä ykkösiä, joten edellinen yhtälö supistuu muotoon  $f(k+1) = f(k) + \phi(2k+1) \leq f(k) + 1$ . Siten  $f$  on kasvava, ja sen arvojoukko koostuu peräkkäisistä luonnollisista luvuista. Toisaalta, kun  $k$  on esimerkiksi muotoa  $2^\ell + 1$ , niin  $\phi(2k+1) = 1$ , joten  $f(k+1) = f(k) + 1$  äärettömän monella  $k$ :n arvolla. Koska  $f(1) = \phi(2) = 0$ ,  $f$  saa kaikki positiiviset kokonaislukuarvot.

b) Kun  $k \geq 2$ ,  $f(k) = f(k-1) + \phi(2k-1)$  ja  $f(k+1) = f(k) + \phi(2k+1)$ . Epäyhtälö  $f(k-1) < f(k) < f(k+1)$  on siis yhtäpitävä sen kanssa, että  $\phi(2k-1) = \phi(2k+1) = 1$ . Kaikki parittomat luonnolliset luvut, joiden binääriesityksessä on kolme ykköstä, voidaan esittää muodossa  $n = 2^{\ell_1} + 2^{\ell_2} + 1$ , missä  $\ell_1 > \ell_2 > 0$ . Jotta sekä  $2k-1$  että  $2k+1$  olisivat tätä muotoa, täytyy olla olemassa sellainen kokonaisluku  $\ell \geq 2$ , että  $2k-1 = 2^{\ell+1} + 3$  eli  $k = 2^\ell + 2$ . Ilmeisesti  $f(2^\ell) = \binom{\ell+1}{3} - \binom{\ell}{3} = \binom{\ell}{2}$ , joten  $f(2^\ell + 2) = f(2^\ell) + \phi(2^\ell + 1) + \phi(2^\ell + 3) = \binom{\ell}{2} + 0 + 1 = 1 + \binom{\ell}{2}$ . Siis yhtälöllä  $f(k) = m$  on täsmälleen yksi ratkaisu, kun  $m = 1 + \binom{\ell}{2}$  jollakin  $\ell \in \mathbb{N}$ ,  $\ell \geq 2$ .

**94.4.** Koska

$$f(m, n) = \frac{n^3 + 1}{mn - 1} = n \frac{n^2 + m}{mn - 1} - 1 = n^3 \frac{m^3 + 1}{mn - 1} - (m^2 n^2 + mn + 1)$$

ja luvuilla  $n$  ja  $mn - 1$  ei ole yhteisiä tekijöitä,  $\frac{n^3 + 1}{mn - 1}$  on kokonaisluku täsmälleen silloin, kun  $\frac{n^2 + m}{mn - 1}$  on kokonaisluku, ja  $f(m, n)$  on kokonaisluku aina, kun  $f(n, m)$  on kokonaisluku. Kun  $n = m$ ,

$$\frac{n^2 + m}{mn - 1} = \frac{n^2 + n}{n^2 - 1} = \frac{n}{n - 1} = 1 + \frac{1}{n - 1},$$

joten ainoa kokonaislukuratkaisu saadaan, kun  $n = 2$ . Koska  $f(m, 1) = \frac{2}{m - 1}$ , tapauksessa  $n = 1$  kokonaislukuratkaisuja saadaan, kun  $m = 2$  tai  $m = 3$ . Kun  $m > n \geq 2$ , on  $n^2 + m \leq n(m - 1) + m(n - 1) = 2mn - m - n < 2(mn - 1)$  eli  $\frac{n^2 + m}{mn - 1} < 2$ , joten, kun merkitään  $m = n + k$ , saadaan kokonaislukuratkaisun ehdoksi  $n^2 + m = mn - 1$  eli  $n^2 + n + k = n(n + k) - 1$  eli  $n + k = kn - 1$  eli  $2 = (k - 1)(n - 1)$ . Viimeinen yhtälö toteutuu, kun  $n = 2$  ja  $m = 5$  tai  $n = 3$  ja  $m = 5$ . Kun  $m:n$  ja  $n:n$  symmetria otetaan huomioon, saadaan kaikkiaan 9 eri ratkaisua  $(2, 2)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(2, 1)$ ,  $(3, 1)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(5, 2)$ ,  $(3, 5)$  ja  $(5, 3)$ .

**94.5.** Oletetaan, että  $f$  on tehtävän ratkaisu. Palautetaan funktionaaliyhtälö yksinkertaisemmaksi ottamalla käyttöön positiivisten realilukujen joukossa määritelty funktio  $g$ ,  $g(x) = 1 + f(x - 1)$ . Tällöin kaikille  $x, y$  pätee

$$\begin{aligned} g(xg(y)) &= 1 + f(x(1 + f(y - 1)) - 1) \\ &= 1 + f(x - 1 + f(y - 1) + (x - 1)f(y - 1)) \\ &= 1 + y - 1 + f(x - 1) + (y - 1)f(x - 1) = y + yf(x - 1) = yg(x). \end{aligned}$$

Vastaavasti jos  $g$  toteuttaa tämän funktionaaliyhtälön, niin  $f : S \rightarrow S$ ,  $f(x) = g(x + 1) - 1$  toteuttaa alkuperäisen. Kuvaus  $g$  on injektio, sillä jos  $g(x) = g(x')$ , niin  $xg(1) = g(1 \cdot g(x)) = g(g(x)) = g(g(x')) = x'g(1)$  ja koska  $g(1) > 0$ , saadaan  $x = x'$ . Edelleen  $g(g(1)) =$

$g(1 \cdot g(1)) = 1 \cdot g(1) = g(1)$ , ja koska  $g$  on injektio,  $g(1) = 1$ . Tutkitaan, onko kuvauksella  $g$  muita kiintopisteitä kuin 1. Kaikilla  $x$  pätee  $g(xg(x)) = xg(x)$ , joten erityisesti jos  $x$  on kiintopiste, niin myös  $xg(x) = x^2$  on. Siten välillä  $(1, \infty)$  on joko äärettömän monta kiintopistettä tai niitä ei ole lainkaan, ja vastaava pätee myös välille  $(0, 1)$ . Toisaalta  $x$  on kuvauksen  $g$  kiintopiste, jos ja vain jos  $f(x-1) = g(x) - 1 = x - 1$  eli  $x' = x - 1$  on kuvauksen  $f$  kiintopiste, mikä taas on yhtäpitävää sen kanssa, että  $f(x')/x' = 1$ . Ehdosta (ii) seuraa suoraan, että kuvauksella  $f$  on korkeintaan kolme kiintopistettä  $x'$ : mahdollisesti  $x' = 0$ , korkeintaan yksi, jolle  $x' > 0$ , ja korkeintaan yksi, jolle  $x' < 0$ . Kuvaukselle  $g$  tämä merkitsee, ettei väleillä  $(0, 1)$  ja  $(1, \infty)$  voi olla useita kiintopisteitä. Tämä sopii yhteen aiemmin todetun kanssa vain, jos 1 on kuvauksen  $g$  ainoa kiintopiste. Koska kuitenkin  $xg(x)$  on kiintopiste jokaisella  $x$ , täytyy olla voimassa yhtälö  $xg(x) = 1$  eli  $g(x) = 1/x$ . Siis kaikilla  $x \in S$  pätee  $f(x) = g(x+1) - 1 = -\frac{x}{x+1}$ .

Varmistetaan vielä, että löydetty  $f$  kelpaa ratkaisuksi. Välittömästi nähdään, että vastaavaa  $g$  noudattaa omaa funktionaaliyhtälöänsä, ja kuten on jo todettu, tästä seuraa, että  $f$  toteuttaa omansa. Lisäksi  $x \mapsto f(x)/x = -\frac{1}{x+1}$  on selvästi aidosti kasvava koko määrittelyjoukossa  $S$ .

**94.6.** Valitaan joukoksi  $A$  kaikkien sellaisten  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$ , joukko, että luvun  $n$  pienin alkutekijä  $p$  on samalla luvun  $n$  alkutekijöiden lukumäärä. Osoitetaan, että  $A$  täyttää annetun vaatimuksen; olkoon siis  $S = \{q_1, q_2, \dots\}$ ,  $q_1 < q_2 < \dots$ , ääretön joukko alkulukuja. Tällöin  $m = q_1 q_2 \dots q_{q_1} \in A$ , mutta  $n = q_2 \dots q_{q_1+1} \notin A$ , sillä luvun  $n$  alkutekijöiden lukumäärä on  $q_1 < q_2$ . Kuitenkin luvuilla  $m$  ja  $n$  on yhtä monta,  $q_1$ , alkutekijää.