

Tehtäviä epäyhtälöistä

Tehtäviä neliöiden ei-negatiivisuudesta

1. Olkoon $a \in \mathbb{R}$. Osoita, että $4a^2 \geq 4a - 1$.

Ratkaisu. $4a^2 \geq 4a - 1 \iff (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 1 + 1^2 \geq 0 \iff (2a - 1)^2 \geq 0$.

2. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}$. Osoita, että $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.

Ratkaisu. Kerrotaan molemmat puolet kahdella:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 &\geq ab + bc + ca \\ \iff 2a^2 + 2b^2 + 2c^2 &\geq 2ab + 2bc + 2ca \\ \iff a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + c^2 - 2ca + a^2 &\geq 0 \\ \iff (a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 &\geq 0. \end{aligned}$$

3. Osoita, että kaikilla $x \in \mathbb{R}$ on $\cos^4 x + \sin^4 x \geq \frac{1}{2}$.

Ratkaisu. $\cos^4 x + \sin^4 x = \frac{1}{2} \left((\cos^2 x + \sin^2 x)^2 + (\cos^2 x - \sin^2 x)^2 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2 2x \geq \frac{1}{2}$.

4. Olkoot a, b, c ja d reaalilukuja. Osoita, että

$$ab + cd \leq \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2}.$$

Milloin tässä epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus?

Ratkaisu. Jos $ab + cd < 0$, niin triviaalisti $ab + cd < \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2}$. Oletetaan siis, että $ab + cd \geq 0$. Tällöin voidaan päätellä:

$$\begin{aligned} ab + cd &\leq \sqrt{a^2 + c^2} \sqrt{b^2 + d^2} \\ \iff (ab + cd)^2 &\leq (a^2 + c^2)(b^2 + d^2) \\ \iff a^2 b^2 + c^2 d^2 + 2abcd &\leq a^2 b^2 + a^2 d^2 + c^2 b^2 + c^2 d^2 \\ \iff 2abcd &\leq a^2 d^2 + c^2 b^2 \\ \iff 0 &\leq (ad - bc)^2. \end{aligned}$$

Haluttu epäyhtälö on todistettu oikeaksi. Yhtäsuuruus pätee täsmälleen silloin kun $ab + cd \geq 0$ ja $ad = bc$.

5. Olkoot a, b, c ja d reaalilukuja. Osoita, että pienin luvuista

$$a - b^2, b - c^2, c - d^2 \text{ ja } d - a^2$$

on pienempi tai yhtä suuri kuin $\frac{1}{4}$.

Ratkaisu. Tehdään se vastaoletus, että kyseiset luvut olisivat kaikki suurempia kuin $\frac{1}{4}$. Tällöin olisi

$$a - b^2 + b - c^2 + c - d^2 + d - a^2 > \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4},$$

eli

$$\begin{aligned} 0 &> a^2 - a + \frac{1}{4} + b^2 - b + \frac{1}{4} + c^2 - c + \frac{1}{4} + d^2 - d + \frac{1}{4} \\ &= \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(d - \frac{1}{2}\right)^2, \end{aligned}$$

mikä on ristiriita, sillä reaalilukujen neliöiden summa ei koskaan voi olla negatiivinen.

6. Etsi kaikki ne reaalilukuviisikot $\langle x, y, u, v, w \rangle$, joille

$$\begin{cases} y^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4x - 1, \\ x^2 + u^2 + v^2 + w^2 = 4y - 1, \\ x^2 + y^2 + v^2 + w^2 = 4u - 1, \\ x^2 + y^2 + u^2 + w^2 = 4v - 1, \\ x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = 4w - 1. \end{cases}$$

Ratkaisu. Laskemalla puolittain yhteen nämä yhtälöt nähdään, että halutunlaiset reaalilukuviisikot toteuttavat yhtälön

$$4x^2 + 4y^2 + 4u^2 + 4v^2 + 4w^2 = 4x + 4y + 4u + 4v + 4w - 1 - 1 - 1 - 1 - 1,$$

eli on oltava

$$4x^2 - 4x + 1 + 4y^2 - 4y + 1 + 4u^2 - 4u + 1 + 4v^2 - 4v + 1 + 4w^2 - 4w + 1 = 0,$$

tai yhtäpitävästi $(2x-1)^2 + (2y-1)^2 + (2u-1)^2 + (2v-1)^2 + (2w-1)^2 = 0$, eli

$$x = y = u = v = w = \frac{1}{2}.$$

Tämä reaalilukuviisikko on siis ainoa mahdollinen ratkaisu. Toisaalta se selvästi on ratkaisu, sillä $4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 = 4 \cdot \frac{1}{2} - 1$.

7. Määritä yhtälön $x^8 - x^7 + 2x^6 - 2x^5 + 3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 4x + \frac{5}{2} = 0$ reaalisten juurien lukumäärä.

Ratkaisu. Kun $x \geq 1$ tai $x \leq 0$, on varmasti

$$x^8 - x^7 + 2x^6 - 2x^5 + 3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 4x + \frac{5}{2} \geq 0 + 0 + 0 + 0 + \frac{5}{2} > 0,$$

eli mahdolliset ratkaisut löytyvät väliltä $]0, 1[$. Olkoon $x \in]0, 1[$. Tällöin varmasti $x^6 + 2x^4 + 3x^2 + 4 < 10$ ja $0 > x^2 - x \geq -\frac{1}{4}$, eli

$$x^8 - x^7 + 2x^6 - 2x^5 + 3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 4x = (x^6 + 2x^4 + 3x^2 + 4)(x^2 - x) > 10 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{5}{2},$$

eli ratkaisuita ei löydy myöskään väliltä $]0, 1[$. Siis tarkasteltavalla yhtälöllä ei ole reaalisia ratkaisuita.

Tehtäviä aritmeettis-geometrisesta epäyhtälöstä

8. Olkoon $a \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq 2$. Milloin tässä epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus?

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$a^2 + \frac{1}{a^2} = 2 \cdot \frac{a^2 + \frac{1}{a^2}}{2} \geq 2 \cdot \sqrt{a^2 \cdot \frac{1}{a^2}} = 2,$$

missä yhtäsuuruus pätee täsmälleen silloin, kun $a^2 = \frac{1}{a^2}$, eli kun $a = 1$.

9. Olkoot a ja b ei-negatiivisia reaalilukuja. Osoita, että $a + 4b \geq 4\sqrt{ab}$.

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$a + 4b \geq 2 \cdot \sqrt{a \cdot 4b} = 4\sqrt{ab}.$$

10. Olkoot $a, b \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$.

Ratkaisu. Käyttämällä aritmeettis-geometrista epäyhtälöä kumpaankin multiplikandiin erikseen, saadaan

$$(a+b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 2\sqrt{a \cdot b} \cdot 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} = 4.$$

11. Osoita, että jos α on terävä kulma, niin

$$\tan \alpha + \cot \alpha \geq 2.$$

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrinen epäyhtälö antaa suoraan

$$\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \geq 2\sqrt{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} = 2.$$

12. Osoita, että jos $a, b, c \in \mathbb{R}_+$, niin

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc.$$

Ratkaisu. Käyttämällä aritmeettis-geometrista epäyhtälöä jokaiseen todistettavan epäyhtälön vasemman puolen multiplikandiin erikseen saadaan

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{bc} \cdot 2\sqrt{ca} = 8abc.$$

13. Osoita, että jokaisella kokonaisluvulla $n > 1$ on

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) < n^n.$$

Ratkaisu. Suoraan aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1) < \left(\frac{1+3+5+\dots+(2n-1)}{n} \right)^n = \left(\frac{n^2}{n} \right)^n = n^n.$$

Tässä yhtäsuuruus ei voi päteä, sillä ei voi olla $1 = 3 = 5 = \dots = 2n-1$.

14. Olkoot $x, y, z \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $\sqrt[3]{xyz} \geq \frac{3}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}$.

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{z}} = \frac{1}{\sqrt[3]{xyz}}.$$

Haluttu tulos saadaan korottamalla tässä epäyhtälön molemmat puolet potenssiin -1 .

15. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$\sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \geq \sqrt{\sqrt[3]{ab \cdot bc \cdot ca}} = \sqrt[3]{abc}.$$

16. Olkoot $a, b \in \mathbb{R}_+$ ja $n \in \mathbb{Z}_+$. Osoita, että $\sqrt[n+1]{ab^n} \leq \frac{a+nb}{n+1}$.

Ratkaisu. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla

$$\frac{a+nb}{n+1} = \frac{a+b+b+\dots+b}{n+1} \geq \sqrt[n+1]{a \cdot b \cdot b \cdot \dots \cdot b} = \sqrt[n+1]{ab^n}.$$

17. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{9}{2(a+b+c)} \leq \frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}.$$

Ratkaisu. Suoraan aritmeettis-harmonisen epäyhtälön nojalla

$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{(a+b) + (b+c) + (c+a)} = \frac{9}{2(a+b+c)}.$$

18. Pisteet M ja N sijaitsevat kolmion $\triangle ABC$ sivulla BC siten, että $\widehat{BAM} = \widehat{CAN}$. Osoita, että

$$\frac{MB}{MC} + \frac{NB}{NC} \geq 2\frac{AB}{AC}.$$

Ratkaisu. Käytetään aluksi aritmeettis-geometrista ja sitten erilaisia geometrisia identiteettejä:

$$\begin{aligned} \frac{MB}{MC} + \frac{NB}{NC} &\geq 2\sqrt{\frac{MB}{MC} \cdot \frac{NB}{NC}} = 2\sqrt{\frac{|\triangle AMB|}{|\triangle AMC|} \cdot \frac{|\triangle ANB|}{|\triangle ANC|}} \\ &= 2\sqrt{\frac{\frac{1}{2} \cdot AM \cdot AB \cdot \sin \widehat{BAM} \cdot \frac{1}{2} \cdot AN \cdot AB \cdot \sin (\widehat{BAM} + \widehat{MAN})}{\frac{1}{2} \cdot AM \cdot AC \cdot \sin (\widehat{MAN} + \widehat{CAN}) \cdot \frac{1}{2} \cdot AN \cdot AC \cdot \sin \widehat{CAN}}} \\ &= 2\sqrt{\frac{AB^2}{AC^2}} = 2\frac{AB}{AC}, \end{aligned}$$

missä $|\triangle XYZ|$ tarkoittaa kolmion $\triangle XYZ$ pinta-alaa.

19. a) Etsi rationaalilukukertoiminen kolmen muuttujan x, y ja z polynomi $Q(x, y, z)$, jolle

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)Q(x, y, z).$$

b) Osoita, että jos a, b ja c ovat positiivisia reaalilukuja, niin

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

Milloin tässä epäyhtälössä vallitsee yhtäsuuruus?

Ratkaisu. a) Polynomi $Q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}((x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2)$ kelpaa:

$$\begin{aligned} (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) &= x^3+xy^2+xz^2-x^2y-xyz-x^2z+x^2y+y^3 \\ &\quad +yz^2-xy^2-y^2z-xyz+x^2z+y^2z+z^3-xyz-yz^2-xz^2 = x^3+y^3+z^3-3xyz. \end{aligned}$$

b) Koska $a > 0, b > 0$ ja $c > 0$, on $\sqrt[3]{a} > 0, \sqrt[3]{b} > 0$ ja $\sqrt[3]{c} > 0$. Siispä sijoittamalla a)-kohdassa saatuun yhtälöön $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}$ ja $z = \sqrt[3]{c}$, saadaan:

$$a+b+c-3\sqrt[3]{abc} = x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z) \cdot \frac{1}{2}((x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2) \geq 0.$$

Koska $x+y+z > 0$, esiintyy yhtäsuuruus täsmälleen silloin kun lukujen $x-y, y-z$ ja $z-x$ neliöt häviävät, eli kun $x = y = z$. Siis

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc},$$

missä yhtäsuuruus esiintyy vain kun $a = b = c$.

20. Olkoot $a, b \in \mathbb{R}_+$ sellaisia, että $a + b = 1$. Osoita, että

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$$

Ratkaisu. Koska mielivaltaisille positiivisille reaaliluvuille x ja y on $x^2 + y^2 \geq 2xy$, on oltava myös $2(x^2 + y^2) \geq x^2 + y^2 + 2xy = (x + y)^2$, eli

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x + y)^2}{2}.$$

Sijoittamalla tähän $x = a + \frac{1}{a}$ ja $y = b + \frac{1}{b}$, saadaan

$$\begin{aligned} \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 &\geq \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{a+b}{a} + \frac{a+b}{b}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + 1 + 1 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)^2 \geq \frac{(3+2)^2}{2} = \frac{25}{2}. \end{aligned}$$

21. a) Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$ sellaisia, että $a + b + c \geq 3$. Onko tällöin välttämättä

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 3?$$

b) Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$ sellaisia, että $a + b + c \leq 3$. Onko tällöin välttämättä

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3?$$

Ratkaisu. a) Ei. Nimittäin jos vaikkapa $a = b = 2$ ja $c = \frac{1}{3}$, niin $a + b + c = 4\frac{1}{3} > 3$, mutta kuitenkin $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 3 = 4 > 3$.

b) Kyllä on. Nimittäin aritmeettis-harmonisesta epäyhtälöstä seuraa, että

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c} \geq \frac{9}{3} = 3.$$

22. Olkoot a, b ja c reaalilukuja, joille $a > b > c > 0$. Osoita, että

$$\frac{c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} + \frac{b}{c} \geq 5.$$

Ratkaisu. Pilkotaan todistettavan epäyhtälön vasemman puolen kaksi jälkimmäistä termiä osiin ja käytetään sopivasti aritmeettis-geometrista epäyhtälöä:

$$\begin{aligned} \frac{c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} + \frac{b}{c} &= \frac{c}{a-b} + \frac{a-b}{b-c} + \frac{b-c}{b-c} + \frac{b-c}{c} + \frac{c}{c} \\ &= \frac{c}{a-b} + \frac{a-b}{b-c} + \frac{b-c}{c} + 2 \geq 3 \sqrt[3]{\frac{c}{a-b} \cdot \frac{a-b}{b-c} \cdot \frac{b-c}{c}} + 2 = 3 + 2 = 5. \end{aligned}$$

23. Olkoon $n \geq 2$ kokonaisluku ja olkoot a_1, a_2, \dots, a_n ei-negatiivisia reaalilukuja. Osoita, että

$$a_n \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \right)^{n-1} \leq \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^n.$$

Ratkaisu. Koska aritmeettis-geometrisen epäyhtälön nojalla jokaisella $b \in \mathbb{R}_+$ on oltava

$$\sqrt[n]{a_n b^{n-1}} \leq \frac{a_n + (n-1)b}{n},$$

on oltava myös

$$a_n \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \right)^{n-1} \leq \left(\frac{a_n + (n-1) \cdot \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n-1}}{n} \right)^n = \left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right)^n.$$

24. Olkoot x, y ja z sellaisia positiivisia reaalilukuja, että $xyz = 32$. Mikä tällöin on lausekkeen $x^2 + 4xy + 4y^2 + 2z^2$ pienin mahdollinen arvo?

Ratkaisu. Käyttämällä aritmeettis-geometrista epäyhtälöä saadaan alaraja

$$\begin{aligned} x^2 + 4xy + 4y^2 + 2z^2 &= x^2 + 2xy + 2xy + 4y^2 + z^2 + z^2 \geq 6 \sqrt[6]{x^2 \cdot 2xy \cdot 2xy \cdot 4y^2 \cdot z^2 \cdot z^2} \\ &= 6 \sqrt[6]{16(xyz)^4} = 6 \sqrt[6]{16 \cdot 32^4} = 6 \sqrt[6]{2^24} = 6 \cdot 2^4 = 96. \end{aligned}$$

Tässä alaraja voidaan saavuttaa vain silloin kun $x^2 = 2xy = 2xy = 4y^2 = z^2 = z^2$, eli kun $x = 2y = z$. Lisäehdon $xyz = 32$ nojalla kyseinen alaraja saavutetaan siis täsmälleen silloin kun $x = z = 4$ ja $y = 2$.

Tehtäviä suuruusjärjestysepähtälöstä

25. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että:

- $a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$.
- $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^2bc + b^2ca + c^2ab$.
- $\frac{a+b+c}{abc} \leq \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$.

Ratkaisu. a) Olkoot luvut a, b, c missä tahansa suuruusjärjestyksessä. Tällöin varmasti luvut a^2, b^2, c^2 ovat myös samassa suuruusjärjestyksessä. Siispä suuruusjärjestysepähtälön nojalla

$$a^2b + b^2c + c^2a \leq a^2 \cdot a + b^2 \cdot b + c^2 \cdot c = a^3 + b^3 + c^3.$$

b) Missä tahansa suuruusjärjestyksessä luvut a, b, c ikinä ovatkaan, ovat luvut a^2, b^2, c^2 ja toisaalta luvut a^3, b^3, c^3 samassa suuruusjärjestyksessä, ja luvut bc, ca, ab taas vastakkaisessa suuruusjärjestyksessä. Nyt voidaan käyttää suuruusjärjestysepähtälöä kahdesti, jolloin saadaan

$$\begin{aligned} a^2bc + b^2ca + c^2ab &\leq a^2 \cdot ab + b^2 \cdot bc + c^2 \cdot ca = a^3 \cdot b + b^3 \cdot c + c^3 \cdot a \\ &\leq a^3 \cdot a + b^3 \cdot b + c^3 \cdot c = a^4 + b^4 + c^4. \end{aligned}$$

c) Suoraan suuruusjärjestysepähtälön nojalla

$$\begin{aligned} \frac{a+b+c}{abc} &= \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{c} + \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{a} \\ &\leq \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{c} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}. \end{aligned}$$

26. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että:

$$\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2} \geq \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}}.$$

Ratkaisu. Suuruusjärjestysepähtälön nojalla $a^2b + b^2c + c^2a$ ja $a^2c + b^2a + c^2b$ ovat aina enintään yhtä suuria kuin $a^3 + b^3 + c^3$. Siispä

$$\begin{aligned} (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2) &= (a^3 + b^3 + c^3) + (a^2b + b^2c + c^2a) + (a^2c + b^2a + c^2b) \\ &\leq (a^3 + b^3 + c^3) + (a^3 + b^3 + c^3) + (a^3 + b^3 + c^3) = 3(a^3 + b^3 + c^3). \end{aligned}$$

Haluttu tulos seuraa tästä jakamalla puolittain luvuilla $a^2 + b^2 + c^2$ ja 3.

Suuruusjärjestysepähtälön nojalla $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$. Siispä

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) \geq 3(ab+bc+ca).$$

Haluttu tulos saadaan tästä ottamalla puolittain neliöjuuret ja jakamalla puolittain luvulla 3.

27. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$a+b+c \leq \frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab}.$$

Ratkaisu. Luvut a^3, b^3, c^3 ja $\frac{1}{bc}, \frac{1}{ca}, \frac{1}{ab}$ ovat aina samassa suuruusjärjestyksessä. Toisaalta luvut a^2, b^2, c^2 ja $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ ovat aina vastakkaisissa suuruusjärjestyksissä. Käyttämällä suuruusjärjestysepähtälöä kahdesti saadaan, että

$$\frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab} \geq \frac{a^3}{ab} + \frac{b^3}{bc} + \frac{c^3}{ca} = \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{a^2}{a} + \frac{b^2}{b} + \frac{c^2}{c} = a+b+c.$$

28. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{a^8 + b^8 + c^8}{a^3b^3c^3} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

Ratkaisu. Koska luvut a^5, b^5, c^5 ja $\frac{1}{b^3c^3}, \frac{1}{c^3a^3}, \frac{1}{a^3b^3}$ ovat aina samassa suuruusjärjestyksessä, ja koska luvut a^2, b^2, c^2 ja $\frac{1}{a^3}, \frac{1}{b^3}, \frac{1}{c^3}$ ovat aina vastakkaisissa suuruusjärjestyksissä, voidaan käyttää suuruusjärjestysepäyhtälöä kahdesti:

$$\begin{aligned} \frac{a^8 + b^8 + c^8}{a^3b^3c^3} &= a^5 \cdot \frac{1}{b^3c^3} + b^5 \cdot \frac{1}{c^3a^3} + c^5 \cdot \frac{1}{a^3b^3} \\ &\geq a^5 \cdot \frac{1}{a^3b^3} + b^5 \cdot \frac{1}{b^3c^3} + c^5 \cdot \frac{1}{c^3a^3} \\ &= a^2 \cdot \frac{1}{b^3} + b^2 \cdot \frac{1}{c^3} + c^2 \cdot \frac{1}{a^3} \geq a^2 \cdot \frac{1}{a^3} + b^2 \cdot \frac{1}{b^3} + c^2 \cdot \frac{1}{c^3} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}. \end{aligned}$$

29. Olkoot a_1, a_2, a_3, \dots pareittain erisuuria positiivisia kokonaislukuja. Osoita, että jokaisella $n \in \mathbb{Z}_+$ on

$$\sum_{\ell=1}^n \frac{a_\ell}{\ell^2} \geq \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell}.$$

Ratkaisu. Olkoot b_1, b_2, \dots, b_n luvut a_1, a_2, \dots, a_n järjestettynä kasvavaan järjestykseen, eli siten, että $b_1 < b_2 < \dots < b_n$. Koska luvut b_1, b_2, \dots, b_n ovat positiivisia kokonaislukuja, on varmasti $b_1 \geq 1, b_2 \geq 2, \dots, b_n \geq n$. Nyt suuruusjärjestysepäyhtälön nojalla

$$\sum_{\ell=1}^n \frac{a_\ell}{\ell^2} = \sum_{\ell=1}^n a_\ell \cdot \frac{1}{\ell^2} \geq \sum_{\ell=1}^n b_\ell \cdot \frac{1}{\ell^2} \geq \sum_{\ell=1}^n \ell \cdot \frac{1}{\ell^2} = \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell}.$$

30. Aritmeettis-geometrisen epäyhtälön todistaminen suuruusjärjestysepäyhtälöllä.

a) Olkoot $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{c_1}{c_n} + \frac{c_2}{c_1} + \frac{c_3}{c_2} + \dots + \frac{c_n}{c_{n-1}} \geq n.$$

c) Olkoot $\varrho, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_+$. Osoita:

$$\frac{\varrho x_1}{\varrho^n x_1 x_2 \cdots x_n} + \varrho x_2 + \varrho x_3 + \dots + \varrho x_n \geq n.$$

b) Olkoot $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{y_1}{y_1 y_2 \cdots y_n} + y_2 + y_3 + \dots + y_n \geq n.$$

d) Osoita lopuksi, että

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

Ratkaisu. a) Kun luvut c_1, c_2, \dots, c_n ovat jossakin suuruusjärjestyksessä, ovat luvut $\frac{1}{c_1}, \frac{1}{c_2}, \dots, \frac{1}{c_n}$ varmasti vastakkaisessa suuruusjärjestyksessä. Täten suuruusjärjestysepäyhtälön nojalla

$$\frac{c_1}{c_n} + \frac{c_2}{c_1} + \dots + \frac{c_n}{c_{n-1}} = c_1 \cdot \frac{1}{c_n} + c_2 \cdot \frac{1}{c_1} + \dots + c_n \cdot \frac{1}{c_{n-1}} \geq c_1 \cdot \frac{1}{c_1} + c_2 \cdot \frac{1}{c_2} + \dots + c_n \cdot \frac{1}{c_n} = n.$$

b) Väite seuraa a)-kohdan epäyhtälöstä sijoituksilla

$$c_1 = y_1, c_2 = y_1 y_2, c_3 = y_1 y_2 y_3, \dots, c_n = y_1 y_2 \cdots y_n.$$

c) Väite seuraa b)-kohdan epäyhtälöstä sijoituksilla

$$y_1 = \varrho x_1, y_2 = \varrho x_2, \dots, y_n = \varrho x_n.$$

d) Sijoittamalla c)-kohdan epäyhtälöön

$$\varrho = \frac{1}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}}$$

saadaan

$$\frac{x_1}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}} + \frac{x_2}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}} + \dots + \frac{x_n}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}} \geq n,$$

eli

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}.$$

Tehtäviä Cauchy–Schwarzin epäyhtälöstä

31. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+$. a) Osoita, että

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right) \geq n^2.$$

b) Osoita, että $a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq \sqrt{n} \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$.

Ratkaisu. a) Käytetään Cauchy–Schwarzin epäyhtälöä:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right) \geq \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{a_k} \cdot \sqrt{\frac{1}{a_k}} \right)^2 = \left(\sum_{k=1}^n 1 \right)^2 = n^2.$$

b) Käytetään jälleen Cauchy–Schwarzin epäyhtälöä:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_n &= 1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + \dots + 1 \cdot a_n \\ &\leq \sqrt{1^2 + 1^2 + \dots + 1^2} \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} = \sqrt{n} \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}. \end{aligned}$$

32. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Osoita, että jos $a_1 + a_2 + \dots + a_n = n$, niin $a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4 \geq n$.

Ratkaisu. Käyttämällä kahdesti Cauchy–Schwarzin epäyhtälöä kuten b)-kohdassa saadaan, että

$$a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4 \geq \frac{(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)^2}{n} \geq \frac{\left(\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{n} \right)^2}{n} = \frac{\left(\frac{n^2}{n} \right)^2}{n} = \frac{n^2}{n} = n.$$

33. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Osoita, että

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq \sqrt{\sqrt[3]{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \sqrt[3]{a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4}}.$$

Ratkaisu. Riittää käyttää Cauchy–Schwarzin epäyhtälöä vain kerran:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \dots + a_n &= \sqrt[3]{a_1} \cdot \sqrt[3]{a_1^2} + \sqrt[3]{a_2} \cdot \sqrt[3]{a_2^2} + \dots + \sqrt[3]{a_n} \cdot \sqrt[3]{a_n^2} \\ &\leq \sqrt{\sqrt[3]{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} \sqrt[3]{a_1^4 + a_2^4 + \dots + a_n^4}}. \end{aligned}$$

34. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} \geq \frac{a+b+c}{2}.$$

Ratkaisu. Cauchy–Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} &\geq \frac{\left(\frac{a}{\sqrt{b+c}} \sqrt{b+c} + \frac{b}{\sqrt{c+a}} \sqrt{c+a} + \frac{c}{\sqrt{a+b}} \sqrt{a+b} \right)^2}{(b+c) + (c+a) + (a+b)} \\ &= \frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)} = \frac{a+b+c}{2}. \end{aligned}$$

35. Polynomien P kertoimet ovat positiivisia reaalilukuja. Osoita, että kaikilla positiivisilla reaaliluvuilla a ja b pätee $\sqrt{P(a)P(b)} \geq P(\sqrt{ab})$.

Ratkaisu. Tämä seuraa suoraan Cauchy–Schwarzin epäyhtälöstä. Nimittäin, jos $P(x) = \sum_{\ell=0}^n c_\ell x^\ell$, missä $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+$, niin

$$\begin{aligned} P(\sqrt{ab}) &= \sum_{\ell=0}^n c_\ell (\sqrt{ab})^\ell = \sum_{\ell=0}^n \sqrt{c_\ell} (\sqrt{a})^\ell \cdot \sqrt{c_\ell} (\sqrt{b})^\ell \\ &\leq \sqrt{\sum_{\ell=0}^n (\sqrt{c_\ell} (\sqrt{a})^\ell)^2} \sqrt{\sum_{\ell=0}^n (\sqrt{c_\ell} (\sqrt{b})^\ell)^2} = \sqrt{\sum_{\ell=0}^n c_\ell a^\ell} \sqrt{\sum_{\ell=0}^n c_\ell b^\ell} = \sqrt{P(a)} \sqrt{P(b)}. \end{aligned}$$

36. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, missä $n \in \mathbb{Z}_+$, ja oletetaan, että $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$. Osoita, että tällöin

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n}.$$

Ratkaisu. Käytetään Cauchyn–Schwarzin epäyhtälöä:

$$\begin{aligned} \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} &\geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \\ &= a_1 + a_2 + \dots + a_n. \end{aligned}$$

37. Olkoot $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $\sqrt{ab} + \sqrt{cd} \leq \sqrt{(a+d)(b+c)}$.

Ratkaisu. Väite seuraa Cauchyn–Schwarzin epäyhtälöstä:

$$\sqrt{ab} + \sqrt{cd} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + \sqrt{d} \cdot \sqrt{c} \leq \sqrt{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{d})^2} \sqrt{(\sqrt{b})^2 + (\sqrt{c})^2} = \sqrt{a+d} \sqrt{b+c}.$$

38. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $9a^2 b^2 c^2 \leq (a^2 b + b^2 c + c^2 a)(ab^2 + bc^2 + ca^2)$.

Ratkaisu. Cauchyn–Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} 9a^2 b^2 c^2 &= (3abc)^2 = (a\sqrt{b} \cdot \sqrt{bc} + b\sqrt{c} \cdot \sqrt{ca} + c\sqrt{a} \cdot \sqrt{ab})^2 \\ &\leq \left((a\sqrt{b})^2 + (b\sqrt{c})^2 + (c\sqrt{a})^2 \right) \left((\sqrt{bc})^2 + (\sqrt{ca})^2 + (\sqrt{ab})^2 \right) \\ &= (a^2 b + b^2 c + c^2 a)(bc^2 + ca^2 + ab^2). \end{aligned}$$

39. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ ($n \in \mathbb{Z}_+$) reaalitykkuja. Osoita, että

$$\sqrt{(a_1 + b_1)^2 + \dots + (a_n + b_n)^2} \leq \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} + \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2}.$$

Ratkaisu. Neliöimällä molemmat puolet todistettava epäyhtälö (nimeltään *Minkowskin epäyhtälö*) saa muodon:

$$(a_1 + b_1)^2 + \dots + (a_n + b_n)^2 \leq a_1^2 + \dots + a_n^2 + b_1^2 + \dots + b_n^2 + 2\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2},$$

mikä pienen sieventämisen jälkeen muuttuu tuttuun muotoon

$$a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \leq \sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2};$$

tämähän on Cauchyn–Schwarzin epäyhtälö.

40. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}_+$, $n \in \mathbb{Z}_+$. a) Osoita, että

$$\sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} + \dots + \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \geq \sqrt{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2}.$$

Ratkaisu. Osoitetaan väite induktiolla parametrin $n \in \mathbb{Z}_+$ suhteen. Tapauksessa $n = 1$ väitetyssä epäyhtälössä vallitsee varmasti yhtäsuuruus ja asia on selvä. Oletetaan siis, että väite pätee jollakin $n \in \mathbb{Z}_+$. Olkoot $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}, b_1, b_2, \dots, b_{n+1} \in \mathbb{R}_+$ jotkin $2(n+1)$ lukua. Tehdystä induktio-oletuksesta ja Minkowskyin epäyhtälöstä seuraa, että

$$\begin{aligned} &\sqrt{a_1^2 + b_1^2} + \sqrt{a_2^2 + b_2^2} + \dots + \sqrt{a_n^2 + b_n^2} + \sqrt{a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2} \\ &\geq \sqrt{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2 + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2} + \sqrt{a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2} \\ &\geq \sqrt{(a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1})^2 + (b_1 + b_2 + \dots + b_n + b_{n+1})^2}. \end{aligned}$$

41. Olkoot x, y ja z ei-negatiivisia reaalilukuja. a) Osoita, että

$$(x + y + z)\sqrt{2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{y^2 + z^2} + \sqrt{z^2 + x^2}.$$

b) Oletetaan lisäksi, että $xyz \neq 0$. Osoita, että

$$2\sqrt{3} \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}}.$$

c) Oletetaan lisäksi, että $0 < x \leq y \leq z$. Osoita, että

$$\sqrt{y^2 + z^2} \leq x\sqrt{2} + \sqrt{(y-x)^2 + (z-x)^2}.$$

Ratkaisu. Nämä epäyhtälöt seuraavat suoraan Minkowskyn epäyhtälöstä:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{y^2 + z^2} + \sqrt{z^2 + x^2} \geq \sqrt{(x+y+z)^2 + (y+z+x)^2} \\ & = \sqrt{2(x+y+z)^2} = (x+y+z)\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2}} \geq \sqrt{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{z}\right)^2} \\ & \geq \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \sqrt{y^2 + z^2} = \sqrt{(x+y-x)^2 + (x+z-x)^2} \leq \sqrt{x^2 + x^2} + \sqrt{(y-x)^2 + (z-x)^2} \\ & = x\sqrt{2} + \sqrt{(y-x)^2 + (z-x)^2}. \end{aligned}$$

Sekalaisia epäyhtälötehtäviä

42. Olkoot $a > b > 0$. Osoita, että lukujen $a + b$ ja $a - b$ käänteislukujen keskiarvo on suurempi kuin luvun a käänteisluku.

Ratkaisu. Lukujen $a + b$ ja $a - b$ käänteislukujen keskiarvo on

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a-b} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{a-b+a+b}{(a+b)(a-b)} = \frac{a}{a^2-b^2} > \frac{a}{a^2} = \frac{1}{a}.$$

43. Kumpi luvuista

$$\frac{10^{2006} + 1}{10^{2007} + 1} \quad \text{ja} \quad \frac{10^{2007} + 1}{10^{2008} + 1}$$

on suurempi?

Ratkaisu. Arvioidaan näiden lukujen erotusta:

$$\begin{aligned} \frac{10^{2006} + 1}{10^{2007} + 1} - \frac{10^{2007} + 1}{10^{2008} + 1} &= \frac{10^{2006+2008} + 10^{2008} + 10^{2006} + 1 - 10^{2007+2007} - 2 \cdot 10^{2007} - 1}{(10^{2007} + 1)(10^{2008} + 1)} \\ &= \frac{10^{2008} + 10^{2006} - 2 \cdot 10^{2007}}{(10^{2007} + 1)(10^{2008} + 1)} = \frac{10^{2006} \cdot (100 + 1 - 20)}{(10^{2007} + 1)(10^{2008} + 1)} = \frac{81 \cdot 10^{2006}}{(10^{2007} + 1)(10^{2008} + 1)} > 0. \end{aligned}$$

Siis ensimmäinen luku on suurempi.

44. Olkoot a, b ja c sellaisia reaalilukuja, että $abc = 1$. Osoita, että enintään kaksi luvuista

$$2a - \frac{1}{b}, \quad 2b - \frac{1}{c} \quad \text{ja} \quad 2c - \frac{1}{a}$$

voivat olla suurempia kuin yksi.

Ratkaisu. Tehdään se vasta oletus, että kaikki kolme lukua olisivat suurempia kuin yksi. Tällöin olisi:

$$\begin{aligned} & \left(2a - \frac{1}{b}\right) \left(2b - \frac{1}{c}\right) \left(2c - \frac{1}{a}\right) > 1 \\ \Leftrightarrow & 8abc - 4(a+b+c) + 2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) - abc > 1 \\ \Leftrightarrow & 2(a+b+c) - \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) < 3. \end{aligned}$$

Toisaalta olisi myös

$$2(a+b+c) - \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 2a - \frac{1}{b} + 2b - \frac{1}{c} + 2c - \frac{1}{a} > 1 + 1 + 1 = 3,$$

mikä on ristiriidassa aiemman epäyhtälön kanssa.

45. a) Olkoot $a > b > 1$. Osoita, että

$$\frac{a}{b} + \frac{1}{a} > \frac{1}{b} + 1.$$

b) Olkoot $a, b \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että $a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$.

c) Olkoot $0 < a < b$. Osoita, että

$$\frac{3a+b}{\sqrt{a}} > \frac{a+3b}{\sqrt{b}}.$$

Ratkaisu. a) Koska luvut ab ja $a-1$ ovat positiivisia, saa niillä kertoa ja jakaa epäyhtälöitä puolittain. Täten:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} + \frac{1}{a} > \frac{1}{b} + 1 & \Leftrightarrow \frac{a^2+b}{ab} > \frac{a+ab}{ab} \Leftrightarrow a^2+b > a+ab \\ & \Leftrightarrow a^2-a > ab-b \Leftrightarrow a(a-1) > b(a-1) \Leftrightarrow a > b. \end{aligned}$$

b) Symmetrian vuoksi voidaan olettaa, että $a \geq b$. Koska tapauksessa $a = b$ todistettavan epäyhtälön molemmat puolet ovat yhtäsuuret, riittää todistaa väite vain tapauksessa $a > b$. Tässä tapauksessa $a-b > 0$ ja voidaan päätellä:

$$a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2 \Leftrightarrow a^3 - a^2b \geq ab^2 - b^3 \Leftrightarrow a^2(a-b) \geq (a-b)b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq b^2,$$

missä viimeinen epäyhtälö tietenkin pätee.

c) Koska luku \sqrt{ab} on positiivinen, voi sillä kertoa epäyhtälöitä puolittain. Tehdään niin:

$$\begin{aligned} \frac{3a+b}{\sqrt{a}} > \frac{a+3b}{\sqrt{b}} & \Leftrightarrow \frac{3a\sqrt{b}+b\sqrt{b}}{\sqrt{ab}} > \frac{a\sqrt{a}+3b\sqrt{a}}{\sqrt{ab}} \Leftrightarrow 3a\sqrt{b}+b\sqrt{b} > a\sqrt{a}+3b\sqrt{a} \\ & \Leftrightarrow (\sqrt{b})^3 - 3(\sqrt{b})^2\sqrt{a} + 3\sqrt{b}(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{a})^3 > 0 \Leftrightarrow (\sqrt{b}-\sqrt{a})^3 > 0. \end{aligned}$$

Tässä viimeinen epäyhtälö pätee koska $\sqrt{b} > \sqrt{a}$.

46. Etsi ne reaalityluvut $x \neq 1$, joille $\frac{1}{1-x} > 1+x$.

Ratkaisu. Tutkitaan ensin, löytyykö ratkaisuita x , joille $x > 1$. Kun $x > 1$, voidaan päätellä:

$$\frac{1}{1-x} > 1+x \Leftrightarrow 1 < (1+x)(1-x) \Leftrightarrow 1 < 1-x^2 \Leftrightarrow x^2 < 0,$$

ja selvästikään tarkasteltava epäyhtälö ei voi ratketa. Halutuille ratkaisuille pätee siis, että $x < 1$. Tällöin voidaan päätellä:

$$\frac{1}{1-x} > 1+x \Leftrightarrow 1 > (1+x)(1-x) \Leftrightarrow 1 > 1-x^2 \Leftrightarrow x^2 > 0.$$

Tässä viimeisin epäyhtälö toteutuu täsmälleen silloin kun $x \neq 0$. Siis ratkaisuehdoksi saadaan ne reaalityluvut x , joille $x \neq 0$ ja $x < 1$, tai yhtäpitävästi: $x \in]-\infty, 0[\cup]0, 1[$.

47. Olkoot $x \geq -1$ reaaliluku ja $n \in \mathbb{Z}_+$. Osoita, että $1 + nx \leq (1 + x)^n$.

Ratkaisu. Olkoon annettu kiinteä $x \in [-1, \infty[$. Todistetaan väite induktiolla parametrin $n \in \mathbb{Z}_+$ suhteen. Tapauksessa $n = 1$ väite yksinkertaistuu muotoon $1 + x \leq 1 + x$, missä itse asiassa pätee aina yhtäsuuruus, ja asia on selvä. Oletetaan, että $1 + nx \leq (1 + x)^n$ jollakin $n \in \mathbb{Z}_+$. Tällöin

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x) \geq (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x,$$

ja nyt väite seuraa induktioperiaatteesta.

48. Olkoot $x > 1$ reaaliluku. Osoita, että $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} > \frac{3}{x}$.

Ratkaisu. Väite seuraa suoraan havainnosta

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{x+1+x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x}{x^2-1} > \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}.$$

49. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{R}_+$. Osoita, että

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Ratkaisu. Käyttämällä aritmeettisharmonista epäyhtälöä saadaan

$$\begin{aligned} \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} &= \frac{a+b+c}{b+c} + \frac{a+b+c}{c+a} + \frac{a+b+c}{a+b} - 3 \\ &= (a+b+c) \left(\frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right) - 3 \geq (a+b+c) \frac{9}{b+c+c+a+a+b} - 3 \\ &= (a+b+c) \frac{9}{2(a+b+c)} - 3 = \frac{9}{2} - 3 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

50. Olkoot a, b, c ja d sellaisia positiivisia reaalilukuja, että $a + b + c + d = 4$. Osoita, että tällöin

$$\sqrt{a+b+c} + \sqrt{a+b+d} + \sqrt{a+c+d} + \sqrt{b+c+d} \geq 6.$$

Ratkaisu. Koska välin $]0, 1[$ reaaliluvuille x pätee aina $\sqrt{x} \geq x$, voidaan arvioida:

$$\begin{aligned} &\sqrt{a+b+c} + \sqrt{a+b+d} + \sqrt{a+c+d} + \sqrt{b+c+d} \\ &= 2 \left(\sqrt{\frac{a+b+c}{4}} + \sqrt{\frac{a+b+d}{4}} + \sqrt{\frac{a+c+d}{4}} + \sqrt{\frac{b+c+d}{4}} \right) \\ &= 2 \left(\sqrt{\frac{a+b+c}{a+b+c+d}} + \sqrt{\frac{a+b+d}{a+b+c+d}} + \sqrt{\frac{a+c+d}{a+b+c+d}} + \sqrt{\frac{b+c+d}{a+b+c+d}} \right) \\ &\geq 2 \left(\frac{a+b+c}{a+b+c+d} + \frac{a+b+d}{a+b+c+d} + \frac{a+c+d}{a+b+c+d} + \frac{b+c+d}{a+b+c+d} \right) \\ &= 2 \cdot \frac{a+b+c+a+b+d+a+c+d+b+c+d}{a+b+c+d} = 2 \cdot \frac{3(a+b+c+d)}{a+b+c+d} = 6. \end{aligned}$$