

# Pellin yhtälöstä

## Ratkaisun olemassaolo

Olkoon  $m$  positiivinen kokonaisluku, joka ei ole neliö. Pellin<sup>1</sup> yhtälö on Diofantoksen yhtälö

$$x^2 - my^2 = 1. \quad (1)$$

Yhtälöllä on triviaaliratkaisut  $x = \pm 1, y = 0$ .

Olkoon  $q$  jokin positiivinen kokonaisluku. Tarkastellaan irrationaalilukuja  $-k\sqrt{m}, k = 1, \dots, q + 1$ . Jokaiseen tällaiseen lukuun voidaan lisätä kokonaisluku  $x_k$  niin, että

$$0 < x_k - k\sqrt{m} < 1.$$

Näiden väliin  $(0, 1)$  kuuluvan  $q + 1$ :n luvun joukossa on laatikkoperiaatteen nojalla aina ainakin kaksi sellaista, esimerkiksi  $x_k - k\sqrt{m}$  ja  $x_{k'} - k'\sqrt{m}$ , joiden keskinäinen etäisyys on pienempi kuin  $\frac{1}{q}$ . Mutta jos asetetaan  $x = x_k - x_{k'}$  ja  $y = k - k'$ , niin

$$0 < |x - y\sqrt{m}| < \frac{1}{q}. \quad (2)$$

Lisäksi  $|y| \leq q$ . Siis

$$\begin{aligned} |x^2 - my^2| &= |x - y\sqrt{m}| |x + y\sqrt{m}| \\ &< \frac{1}{q} |x - y\sqrt{m} + 2y\sqrt{m}| \leq \frac{1}{q} \left( \frac{1}{q} + 2q\sqrt{m} \right) < 1 + 2\sqrt{m}. \end{aligned} \quad (3)$$

Jokaista epäyhtälön (2) toteuttavaa lukuparia kohden voidaan löytää uusi pari esimerkiksi valitsemalla uusi  $q > |x - y\sqrt{m}|$ . Kokonaislukupareja, jotka toteuttavat epäyhtälön (3) on siis äärettömän monta. Mutta tämä merkitsee, että jollakin kokonaisluvulla  $r < 1 + 2\sqrt{m}$  yhtälöllä

$$x^2 - my^2 = r$$

on äärettömän monta kokonaislukuratkaisua.

Nämä äärettömän monta lukua omaavat vain äärellisen määrän jakojäännöspareja mod  $r$ . On siis luvut  $x_1, x_2$ , missä  $x_1 \equiv x_2 \pmod{r}$ , ja  $y_1, y_2$ , missä  $y_1 \equiv y_2 \pmod{r}$ , niin, että

$$x_1^2 - my_1^2 = r, \quad x_2^2 - my_2^2 = r,$$

ja  $y_1^2 \neq y_2^2$ . Mutta tällöin  $x_1y_2 \equiv x_2y_1 \pmod{r}$  eli  $x_1y_2 - x_2y_1 = y'r$ , missä  $y'$  on kokonaisluku, ja

$$\begin{aligned} r^2 &= (x_1^2 - my_1^2)(x_2^2 - my_2^2) = x_1^2x_2^2 + m^2y_1^2y_2^2 - m(x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2) \\ &= (x_1x_2 - my_1y_2)^2 - m(x_1y_2 - x_2y_1)^2 = (x_1x_2 - my_1y_2)^2 - mr^2y'^2. \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup> John Pell (1611–85) oli englantilainen matemaatikko, diplomaatti ja pappi. Ei ole varmaa tietoa siitä, että hän olisi mitenkään ollut tekemisissä Pellin yhtälön kanssa.

Nyt on myös luvun  $x_1x_2 - my_1y_2$  oltava  $r$ :llä jaollinen, siis muotoa  $rx'$ ,  $x$  kokonaisluku. Siis  $x'^2 - my'^2 = 1$ . Pellin yhtälöllä on siis jokin kokonaislukuratkaisu. Se, että  $y' \neq 0$  seuraa yhtälöistä  $x_1^2 - my_1^2 = r$ ,  $x_2^2 - my_2^2 = r$ ; kun näistä eliminoidaan  $m$ , saadaan  $x_1^2y_2^2 - x_2^2y_1^2 = r(y_2^2 - y_1^2)$ . Jos olisi  $y' = 0$ , olisi  $x_1y_2 = x_2y_1$  ja  $y_1^2 = y_2^2$ , vastoin edellä tehtyjä valintoja.

## Ratkaisuja on monta

Olkoon nyt  $(a, b)$  jokin yhtälön (1) ratkaisu. Tarkastellaan lukuja

$$(a + b\sqrt{m})^k = x_k + y_k\sqrt{m}.$$

Tässä  $x_k$  on muotoa  $\binom{k}{2j} a^{k-2j} (b\sqrt{m})^{2j}$  olevien termien summa ja  $y_k$  muotoa  $\binom{k}{2j+1} a^{k-2j-1} (b\sqrt{m})^{2j+1}$  olevien termien summa. Tällöin  $(a - b\sqrt{m})^k = x_k - y_k\sqrt{m}$  ja  $x_k^2 - my_k^2 = (x_k + y_k\sqrt{m})(x_k - y_k\sqrt{m}) = (a + b\sqrt{m})^k (a - b\sqrt{m})^k = (a^2 - mb^2)^k = 1$ . Jokainen pari  $(x_k, y_k)$  on siis yhtälön (1) ratkaisu. Koska  $a + m\sqrt{m} \neq 1$ , parit  $(x_k, y_k)$  eivät ole samoja. Pellin yhtälöllä (1) on siis äärettömän monta ratkaisua.

Olkoon erityisesti  $(a, b)$  se yhtälön (1) ratkaisu, jolle  $a + b\sqrt{m}$  on positiivinen ja mahdollisimman pieni. Kaikki yhtälön (1) ratkaisut ovat silloin lukupareja  $(\pm x_k, \pm y)$ , missä  $x_k + y_k\sqrt{m} = (a + b\sqrt{m})^k$ . Olkoon  $(x, y)$ , missä  $x$  ja  $y$  ovat positiivisia, jokin yhtälön (1) ratkaisu. Silloin jollakin  $k$  on

$$(a + b\sqrt{m})^k \leq x + y\sqrt{m} < (a + b\sqrt{m})^{k+1}$$

eli

$$1 \leq (x + y\sqrt{m})(a - b\sqrt{m})^k = xx_k - myy_k + (x_ky - y_kx)\sqrt{m} < a + b\sqrt{m}. \quad (4)$$

Mutta koska  $(x + y\sqrt{m})(x_k - y_k\sqrt{m})(x - y\sqrt{m})(x_k + y_k\sqrt{m}) = (x^2 - my^2)(a_k - mb_k) = 1$ , pari  $(xx_k - myy_k, yx_k - xy_k)$  on yhtälön (1) ratkaisu. Epäyhtälön (4) ja  $a + b\sqrt{m}$ :n minimaalisuuden nojalla tämän ratkaisun on oltava triviaaliratkaisu. Yhtälöparista

$$\begin{cases} x_kx - my_ky = 1 \\ -y_kx + x_ky = 0 \end{cases}$$

ratkaistaan  $(x_k^2 - my_k^2)y = y_k$  eli  $y = y_k$  ja  $x = x_k$ . Väite on todistettu.

Edellä olevia ajatuksia voi lukea myös niin että kahdesta samasta tai eri yhtälön ratkaisusta  $(x, y)$  ja  $(x', y')$  voi muodostaa uuden ratkaisun  $(xx' + myy', yx' + xy')$ , sillä  $(xx' + myy')^2 - m(yx' + xy')^2 = (x^2x'^2 + m^2y^2y'^2 - mx^2y'^2 - mx'^2y^2) = (x^2 - my^2)(x'^2 - my'^2) = 1$ . Lähtemällä minimiratkaisusta voidaan näin rakentaa jono ratkaisuja  $(x_k, y_k)$ ; voidaan osoittaa, että tässä jonossa ovat kaikki ratkaisut, joissa  $x$  ja  $y$  ovat positiivisia.

## Ratkaisun löytäminen

Pellin yhtälön (1) ratkaisun löytämiseksi voi lähteä tarkastelemaan jonoa  $m + 1, 4m + 1, 9m + 1, \dots$ ; pienin  $b$ , jolla  $mb^2 + 1$  on neliö, antaa minimiratkaisun. Esimerkiksi yhtälön

$$x^2 - 3y^2 = 1$$

minimiratkaisu on  $(2, 1)$ . Koska  $(2 + \sqrt{3})^2 = 7 + 4\sqrt{3}$  ja  $(2 + \sqrt{3})^3 = 26 + 15\sqrt{3}$ , ratkaisuja ovat esimerkiksi  $(7, 4)$  ja  $(26, 15)$  (ja esimerkiksi  $(137379191137, 79315912984)$ , joka saadaan luvusta  $(2 + \sqrt{3})^{20}$ ).  $m$ :stä riippuen jonoa  $mk^2 + 1$  joudutaan tutkimaan välillä kovin pitkään.

Toinen ratkaisualgoritmi perustuu *ketjumurtolukuihin*. Tässä sivuutetaan perustelut. Käytetään lyhennysmerkintää

$$[a_0; a_1, a_2, a_3, a_4, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4 + \dots}}}}$$

Tässä  $a_i$ :t ovat ei-negatiivisia kokonaislukuja. Jokainen positiivinen rationaaliluku voidaan kirjoittaa (Eukleideen algoritmin avulla) päättyväksi ketjumurtoluvuksi, ja jokainen päättyvä ketjumurtoluku on rationaaliluku. Jokainen positiivinen irrationaaliluku  $A$  voidaan kirjoittaa yksikäsitteisellä tavalla päättymättömäksi ketjumurtoluvuksi yksinkertaisella algoritmilla:  $a_0$  on  $A$ :n kokonaisosa,  $a_1$   $A$ :n desimaaliosan käänteisluvun kokonaisosa jne.

Eryityisesti jokainen toisen asteen yhtälön irrationaalinen ratkaisu ja siten jokainen irrationaaliluku  $\sqrt{m}$  tuottaa *jaksollisen* ketjumurtoluvun. Kun tarkastellaan  $\sqrt{m}$ :n ketjumurtolukukehitelmän alkuosaa  $A_k = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_k] = \frac{p_k}{q_k}$ , missä  $p_k$ :lla ja  $q_k$ :lla ei ole yhteisiä

tekijöitä, ominaisuuksia, niin päädytään havaitsemaan, että yhtälön (1) minimiratkaisu on  $(p_j, q_j)$ , missä  $j = lh - 1$ ,  $h$   $\sqrt{m}$ :n jakson pituus, ja  $2l = 3 - (-1)^h$ . Kaikki ratkaisut saadaan pareista  $(p_{lhk-1}, q_{lhk-1})$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . Eryyisen mukavia ovat luvut  $m = n^2 + 1$ . Tällöin  $\sqrt{m} = [n; 2n, 2n, \dots]$ , joten  $h = 1$ ,  $m = 2$  ja  $j = 1$ , josta seuraa, että minimiratkaisu on  $(2n^2 + 1, 2n)$ . Esimerkiksi yhtälön  $x^2 - 50y^2 = 1$  minimiratkaisu on  $(99, 14)$ . Toisaalta Pellin yhtälöjen ratkaisut saattavat olla melko hankalia. Matematiikan historiassa mainitaan usein Bhaskaran<sup>2</sup> yhtälö  $x^2 - 61y^2 = 1$ . Luvun  $\sqrt{61}$  ketjumurtokehitelmän jakson pituus on 11:

$$\sqrt{61} = [7; 1, 4, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 14, \dots].$$

Minimiratkaisuksi tulee  $(1766319049, 226153980)$ .

---

<sup>2</sup> Bhaskara II (1114–85) jatkoi ansiokkaasti Brahmaguptan (598–670) alkuun panemaa Pellin yhtälöiden tutkimusta Intiassa.